

**ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ВАЗИРЛИГИ
ТОШКЕНТ ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ**

2023 №2

2011 йилдан чиқа бошлаган

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI



ВЕСТИК ТАШКЕНТСКОЙ МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ

Тошкент

Shagazatova B.X., Qudratova N.A. TANA VAZNINI TUZATISHNING OPERATIVVA OPERATIVBO'LMAGAN USULLARI SAMARADORLIGINI QIYOSIY BAHOLASH	Shagazatova B.Kh., Kudratova N.A. COMPARATIVE EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF OPERATIVE AND NON-OPERATIVE METHODS OF BODY WEIGHT CORRECTION	184
Shadmanova L.Sh., Yadgarova N.F., Zokirov M.M., Rajabov M.N., Nasretdinova G.M., Vosikov B.A. KEKSA YOSHDAGI BEMORLARDA AFFEKTIV-IPOXONDRIAL BUZILISHLARNING KLINIK XUSUSIYATLARI	Shadmanova L.Sh., Yadgarova N.F., Zokirov M.M., Rajabov M.N., Nasretdinova G.M., Vosikov B.A. CLINICAL FEATURES OF AFFECTIVE-HYPOCHONDRIACAL DISORDERS IN ELDERLY PATIENTS	188
Шамиров Д.А., Нодирханова Н.С. ЗНАЧИМОСТЬ ПОЛИМОРФИЗМА АССОЦИАЦИИ АЛЛЕЛЬНЫХ ВАРИАНТОВ И ГЕНОТИПОВ ГЕНА ИЛ-23 В ПАТОГЕНЕЗЕ ГЕНИТАЛЬНОГО ПРОЛАПСА ПОСЛЕ ГИСТЕРЭКТОМИИ	Shamirov D.A., Nodirkhanova N.S. SIGNIFICANCE OF ASSOCIATION POLYMORPHISM OF ALLELIC VARIANTS AND GENOTYPES OF THE IL-23 GENE IN THE PATHOGENESIS OF GENITAL PROLAPSE AFTER HYSTERECTOMY	191
Шамсутдинова М.И., Шамсутдинов М.М., Тойчиев А.Х., Осипова С.О., Таджиева З.М., Ёрлаев Н.Ф. ЗОНУЛИН КАК ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ МАРКЕР КИШЕЧНОЙ ПРОНИЦАЕМОСТИ У БОЛЬНЫХ ЯЗВЕННЫМ КОЛИТОМ	Shamsutdinova M.I., Shamsutdinov M.M., Toychiev A.H., Osipova S.O., Tadjieva Z.M., Yorlaev N.F. ZONULIN AS A DIAGNOSTIC MARKER OF INTESTINAL PERMEABILITY IN PATIENTS WITH ULCERATIVE COLITIS	196
Шукрова У.П., Мухамедова Н.Х., Бауэтдинова Г.Д. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЭНДОТЕЛИЯ СОСУДОВ У БОЛЬНЫХ НЕФРОСКЛЕРОЗОМ ПОЧЕК ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ПИЕЛОНЕФРИТЕ	Shukurova U.P., Mukhamedova N.Kh., Bauetdinova G.D. ASSESSMENT OF THE STATE OF THE VASCULAR ENDOTHELIUM IN PATIENTS WITH KIDNEY NEPHROSCLEROSIS WITH CHRONIC PYELONEPHRITIS	199
Ярашев С.С., Кадиров Р.Н., Нуриллаев Х.Ж., Абдиқадиров У.К. ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ПРИМЕНЕНИЮ МИНИИНВАЗИВНЫХ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ И ХОЛЕДОХОЛИТИАЗОМ	Yarashev S.S., Kadirov R.N., Nurillaev Kh.Zh., Abdikadirov U.K. DIFFERENTIATED APPROACH TO THE USE OF MINIMALLY INVASIVE METHODS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS AND CHOLEDО-CHOLITHIASIS	202

ГИГИЕНА, САНИТАРИЯ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ	HYGIENE, SANITATION AND EPIDEMIOLOGY	
Отажонов И.Т. «АНДИЖОН ШАҲРИ БОЛАЛАРИ ОРАСИДА «ҲАҚИҚИЙ» КАСАЛЛАНИШ	Otazhonov I.T «REAL» MORBIDITY AMONG CHILDREN OF THE CITY OF ANDIJAN	206
Садирходжаева Н.С., Камилова Р.Т., Ибрагимова Л.А., Ильясова М.М. ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНОГО ПИТАНИЯ	Sadirkhodzhaeva N.S., Kamilova R.T., Ibragimova L.A., Ilyasova M.M. CHARACTERISTICS OF THE PHYSICAL DEVELOPMENT OF STUDENTS DEPENDING ON THE ORGANIZATION OF SCHOOL MEALS	209
Tadjiyev B.M., Matyakubov M.B., Mirhashimov M.B., Aliyeva G.R. VIRUSLI GEPATITLAR BILAN KASALLANISHLARNING EPIDEMIOLOGIK TAXLILI	Tadjiyev B.M., Matyakubov M.B., Mirhashimov M.B., Aliyeva G.R. EPIDEMIOLOGICAL ANALYSIS OF INCIDENCE WITH VIRUS HEPATITIS	214
Хайтов М.А., Мухамедалиева Н.М., Эсамуратов А.И., Абдуллаев И.К. ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА СОМАТИК КАСАЛЛИКЛАРНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИҲАТЛАРИ	Khaitov M.A., Mukhamedalieva N.M., Esamuratov A.I., Abdullaev I.K. MEDICAL AND SOCIAL ASPECTS OF SOMATIC FACTORS THAT CAUSE DISEASES IN EMPLOYEES OF INTERNAL AFFAIRS BODIES	218
Худайберганов А.С., Бободжонов Б.Р., Носирова А.Р. ИССЛЕДОВАНИЕ АЛИМЕНТАРНЫХ ФАКТОРОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРОЦЕССАМ СТАРЕНИЯ В УЗБЕКИСТАНЕ	XKhudaiberganov A.S., Bobodzhonov B.R., Nosirova A.R. STUDIES OF NUTRITIONAL FACTORS COUNTERACTING THE AGING PROCESS IN UZBEKISTAN	222
Шомуротова Н.Ш., Дусчанов Б.А., Зокирходжаев Ш.Я., Рўзметова Да.А. СУРУНКАЛИ ГЕПАТИТ БИЛАН ХАСТАЛАНГАН БЕМОРЛАРНИНГ ЁЗ-КУЗ МАВСУМИДАГИ КУНЛИК ОВҚАТЛАНИШ ТАРТИБИНИ ГИГИЕНИК БАҲОЛАШ	Shamuratova N.Sh., Duschanov B.A., Zokirxodjaev Sh.Ya., Ruzmetova D.A. HYGIENIC ASSESSMENT OF THE DAILY DIET OF PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS IN THE SUMMER-AUTUMN SEASON	227

СУРУНКАЛИ ГЕПАТИТ БИЛАН ХАСТАЛАНГАН БЕМОРЛАРНИНГ ЁЗ-КУЗ МАВСУМИДАГИ КУНЛИК ОВҚАТЛАНИШ ТАРТИБИНИ ГИГИЕНИК БАҲОЛАШ

Шомуротова Н.Ш., Дусчанов Б.А., Зокирходжаев Ш.Я., Рўзметова Д.А.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СУТОЧНОГО ПИТАНИЯ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ В ЛЕТНЕ-ОСЕНННЕМ СЕЗОНЕ

Шамуратова Н.Ш., Дусчанов Б.А., Зокирходжаев Ш.Я., Рузметова Д.А.

HYGIENIC ASSESSMENT OF THE DAILY DIET OF PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS IN THE SUMMER-AUTUMN SEASON

Shamuratova N.Sh., Duschanov B.A., Zokirxodjaev Sh.Ya., Ruzmetova D.A.

Тошкент тиббиёт академияси Урганч филиали

Цель: гигиенический анализ абсолютного питания пациентов с хроническим гепатитом. **Материал и методы:** в основную группу вошли 45 больных в возрасте от 21 года до 74 лет, получавших профилактическое лечение в домашних условиях с помощью диетотерапии, контрольная группа состояла из 45 больных, получавших лечение традиционной диетотерапии. Питание пациентов изучали расчетным и лабораторным методами. Для статистического анализа было оценено 540 рационов. **Результаты:** в суточном рационе увеличилось потребление мучных изделий из высшего сорта у мужчин с 114,6 до 123,6%, у женщинам с 113,1 до 131,8%. Потребления фруктов и овощей ниже минимальной физиологической нормы. Избыточную массу тела имели 44 (48,9%) больных, ожирение - 7 (7,7%). Выводы: причиной роста частоты обострений заболевания явилось увеличение количества углеводов и недостаточность в ежедневном рационе свежих фруктов и овощей.

Ключевые слова: питание, гигиенический анализ, хронический гепатит, цирроз печени, летне-осенний сезон.

Objective: Hygienic analysis of the daily diet and daily nutrition of patients with chronic hepatitis during the day at home. **Material and methods:** The main group included 45 patients aged 21 to 74 who received prophylactic treatment at home with the help of diet therapy, and the control group consisted of 45 patients who received traditional diet therapy. The nutrition of patients was studied by calculation and laboratory methods. For statistical analysis, 540 diets were evaluated. **Results:** In the daily diet, the consumption of flour products from the highest grade increased in men from 114.6% to 123.6%, in women from 113.1% to 131.8%. Consumption of fruits and vegetables does not meet the physiological norm, but also below the minimum physiological norm. In terms of malnutrition of patients, overweight was registered in 44 (48.9%) patients, obesity in 7 (7.7%) patients. **Conclusions:** An increase in the amount of carbohydrates and a lack of fresh fruits and vegetables in the daily diet caused an increase in the exacerbation of the disease.

Key words: nutrition, hygienic analysis, chronic hepatitis, liver cirrhosis, summer-autumn season.

Аҳоли орасида соғлом турмуштарзининг издан чиқиши, кун давомидаги соғлом овқатланиш ва унинг таркибидаги оқсил, ҳайвон оқсилларнинг камайиши, ҳайвон ёғларнинг рацион таркибидан даврий етишмаслиги, ўсимлик мойларнинг миқдорининг кескин ортиши, транс мойларнинг даврий ишлатилиши, карбонсувлар миқдорининг кўпайиши, етарли даражадаги минерал ва витаминлар билан таъминланмаганлиги улар орасида нутриентлар билан боғлиқ касалликларнинг ривожланиши билан биргалиқда тури метаболик касалликларни ривожланишига шароит яратиши қатор илмий манбаларда қайд қилинган [5,7,9]. Нутриентив таркибининг бузилиши натижасида юзага келадиган касалликларга тури даражадаги моддалар алмашунви касалликлари, юрак-қон томир тизими касалликлари, қандли диабет, аёлларда остеопороз, тури даражадаги ўткир ва сурункали торовоқ, алюлергик касалликлари ва иммун тизими касалликларнинг пасайиши ривожланишига ўшароит яратади [1,6,2]. Нотўғри овқатланиш натижасида, яъни кунлик рацион таркибининг бузилиши, қатор шириналлар, аччиқ ва шўр маҳсулотлари, қатор шириналлар-

нинг ортиши эса аллергик касалликлари, тури ддаражадаги таров, қандли диабет, юрак-қон томир тизими касалликлари билан биргалиқда тури даражадаги гаситиритларнинг ривожланишига шароит яратиши қатор олимларнинг ишларида қайт қилинган. шунда келиб чиқсан ҳолда сурункали гепатитлар билан хасталангандеморларнинг овқатланиш аттрибини таҳлил қилиш бугунги кундаги дол зарб муаммолардан биридир [3,4,8].

Тадқиқот мақсади

Сурункали гепатит билан хасталангандеморларнинг мутлоқ, кун давомида, уй шароитида истеъмол қилган овқатланиш тартиби ва кунлик рационини гигиеник таҳлил қилишдан иборат.

Материал ва усуллар

Назорат остига тадқиқот ишларини амалга ошириш мақсадида Хоразм вилояти кўп тармоқли тиббиёт марказининг гастроэнтерология бўлимида 2019-2021 йиллар давомида сурункали токсик, вирусли В ва С гепатит ва жигар цирози билан хасталанганд 21 ёшдан 74 ёшгача бўлган 45 нафар демор асосий гурухга ва назорат гурухига 45 нафар жигарнинг сурункали касалликлари билан хасталанганд ва

анъянавий даволангган беморлар олинган. Биз асосан ушбу контингентни даволанишгача бўлган даврдаги уй шароитидаги кунлик овқатланиш тартиби ни таҳлил қилдик. Беморларнинг овқатланиши икки гурух усуллари-ҳисоблаш ва лаборатор усулларида ўрганилди. Статистик таҳлил учун 540 та таомнома усулида баҳоланди. Рационларнинг озуқавий қиймати «Озиқ-овқат маҳсулотларини кимёвий таркиби» жадваллари асосида ҳисобланди. Олинган маълумотларни баҳолаш СанҚваМ 0105-01 «Ўзбекистон Республикаси аҳолиси учун озиқ-овқат маҳсулотларини истеъмолини ўртача кунлик рационал меъёрлари» талабларини ҳисобга олган ҳолда ўтказилган. Овқатланиш рационининг озуқавий қиймати йилнинг ёз-куз мавсумлари учун алоҳида 38 та кўрсаткичлар бўйича баҳоланди. Назорат остига олинган bemорларнинг текшириш ёш ва жинс бўйича тақсимоти ўрганилганда 90 нафарни ташкил этиб, улардан энг кўпини, яъни, 29 нафарни 60-69 ёшли ва 17 нафарни 50-59 ёшли bemорлар, 12 нафарни 30-39 ёшли bemорлар, 21нафарни 40-49 ёшли bemорлар, 6 нафарни 20-29 ёшли bemорлар, 5 нафарни 70-79 ёшли bemорлар ташкил қилди.

Натижалар

Жаҳоннинг ривожланган ва ривожланмаган мамлакатларида аҳоли орасида амалга ошириладиган энг асосий тадбирлардан бири улар орасида соғлом овқатланишни ташкиллаштириш ва уни баҳолашга қаратилган. Бироқ, қатор тадбирлар амалга оширилишига қарамасдан, аҳоли орасида нутриентив таркибининг етишмаслиги оқибатидағи касалликларнинг сони кескин ортиб бормоқда. Гигиеник талабларга мос келмайдиган овқатланиш тартиби, нафақат сурункали гепатитларни, шу билан биргаликда овқатланиш билан боғлиқ касалликларни ривожланишига шароит яратиши қатор муаллифларнинг ишларида ҳам баён этилган. Биз пациентларимизнинг кунлик овқатланиш тартибининг йилнинг ёз-куз фаслида алоҳида ўрганишни мақсад қилиб олдик. Биз касалликнинг эпидемиологик таҳлилидан ташқари, овқатланиш билан боғлиқ хусусиятларни илмий асослашни асосий вазифамиз деб ҳисобладик. Экспедиция шароитида йилнинг ёз-куз фаслида ва ҳар ойида 9 тадан намуналарни олган тартибда таҳлил қилдик (1-жадвал).

1-жадвал

Беморларнинг ёз мавсумида истеъмол қилган кунлик озиқ-овқат маҳсулотларини миқдорий даражаси

Маҳсулот	Физиолого-гик меъёр		Мутлоқ истеъмол даражаси		%		Меъёрга нисбатан камлиги	
	Эркак	Аёл	Эркак	Аёл	Эркак	Аёл	Эркак	Аёл
Ун	20	20	27,5±1,6	23,6±0,7	137,5	118,0	+7,5	+3,6
Гуруч	50	45	52,0±1,7	47,0±0,7	104,0	104,4	+2,0	+2,0
Бўтқалар	20	20	13,0±1,3	10,0±1,0	65,0	50,0	-7,0	-10,0
Нон	250	220	284±29,9	268,5±18,8	114	122	+34	+48,5
Макарон	50	40	47,4±3,5	49,1±1,5	95	123	-2,6	+9,1
Картошка	220	200	211,5±22,3	227±5,1	96	114	-8,5	+27
Карам	50	50	56,8±1,6	51,1±1,6	114	102	+6,8	+1,1
Бодринг, помидор	100	100	93,1±3,3	85±3,2	93	85	-6,9	-15
Лавлаги ва сабзи	80	80	70,6±2,5	68,4±3,5	88	86	-9,4	-11,6
Бошқа сабзовот	60	60	64,7±2,0	63,4±2,6	108	106	+4,7	+3,4
Полиз экинлари	50	50	42,0±1,4	32,0±1,5	84,0	64,0	-8,0	-18,0
Қовоқ	30	30	0	0	0	0	-30,0	-30,0
Мевалар	250	250	233,9±4,9	127±5,1	94	51	-16,1	-123
Курит, мевалар	20	20	15±1,5	13,5±1,5	75,0	67,5	-5,0	-6,5
Узум	30	30	19±2,0	15,0±1,9	63,3	50,0	-11,0	-15,0
Цитрус мевалар	15	15	10,2±1,2	10,3±1,6	68	69	-4,8	-4,7
Мол гўшти	60	60	45±3,2	38,7±4,3	75	65	-15	-21,3
Қўй гўшти	30	20	23±1,4	13,7±1,2	76,7	68,5	-7,0	-6,3
Ич маҳсулотлари	8	5	0	0	0	0	-8,0	-5,0
Товуқ	70	60	60,4±2,7	46±3,34	86	77	-9,6	-14
Колбаса	25	15	28,0±2,0	17,6±2,3	112,0	117,3	+3,0	+2,6
Балиқ	35	35	27,6±1,6	22,5±2,8	79	64	-7,4	-12,5
Балиқ тузланган	8	3	5,5±1,0	1,5±1,0	68,7	50,0	-2,5	-1,5
Балиқ консерва	22	22	18,1±1,5	17,4±2,1	82	79	-4,0	-4,6
Сут	400	400	294±29,6	263±35,5	74	66	-106	-137
Сметана, қаймоқ	15	15	9±1,4	8±2,1	60,0	53,3	-6,0	-7,0

Ҳайвон ёғи	30	25	$16,9 \pm 1,4$	$14 \pm 1,9$	56,3	56,0	-13,1	-11,0
Сузма	25	20	$21,4 \pm 1,0$	$17,4 \pm 1,0$	86,0	87,0	-3,6	-2,6
Пишлоқ,	20	20	$14 \pm 1,2$	$11 \pm 1,4$	70,0	55,0	-6,0	-9,0
Тухум	1	1	$2,0 \pm 0,52$	$0,5 \pm 0,5$	200,0	500,0	+1,0	--0,5
Шакар	30	20	$35,0 \pm 2,3$	$28,7 \pm 3,2$	116,7	143,5	+5,0	+8,7
Маргарин	5	5	$10,2 \pm 1,2$	$10,2 \pm 1,2$	204,0	204,0	+5,2	+5,2
Ўсимлик мойи	30	25	$23,7 \pm 1,2$	$22,1 \pm 1,4$	79,0	88,4	-6,3	-2,9
Мош	6	6	$5,5 \pm 1,0$	0	91,6	0	-0,5	-6,0
Ловия	6	6	$5,5 \pm 1,0$	$5,5 \pm 1,0$	91,6	91,6	-0,5	-0,5
Нўхат	8	8	$5,5 \pm 1,0$	$5,5 \pm 1,0$	68,8	68,8	-2,5	-2,5
Туз	5	5	$9,2 \pm 1,4$	$8,9 \pm 1,0$	184,0	178,0	+4,2	+3,9
Қандолат маҳс.	40	40	$42,0 \pm 1,6$	$43,0 \pm 4,4$	105,0	107,5	+2,0	+3,0

Назорат остига олинган беморларнинг йилнинг ёз мавсумидаги овқатланиш тартибининг гигиеник таҳлилидан кўриниб турибди, уларнинг асосий кунлик рациони ўрта кунлик, физиологик - меъёрий даражаларга мос келмайди, бироқ минимал физиологик-меъёрдан ҳам айрим маҳсулотларнинг камлиги, нон ва нон маҳсулотларининг ортиқчалиги кўриниб турибди. Ушбу тартибдаги овқатланиш тартиби эса беморларнинг орасида нафақат овқатланиш тартибининг бузилиши, балким, улар орасида турли нутриентив ҳолатига боғлиқ касалликларнинг ривожланишига шароит яратади. Ёз мавсуми бўлишига қарамай беморларнинг кунлик рациони таркибида ун маҳсулотлари эркакларда 138%га, аёлларда 118%га ортиқчалиги таъминланган. Беморларнинг кунлик рациони таркибида тухум 2,0 марта ортиқча таъминланган бўлса, туз маҳсулотларининг таркиби белгиланган тартибидан аналогик ҳолатда 184% ва 178% га ортиқчалиги, қандолат маҳсулотларининг миқдори ҳам ортиқчалигини кўрсатиб ту-

рибди. Олиб борилган илмий таҳдилларимиз шуни кўрсатадики, беморларнинг кунлик рациони таркибида бўтқаларнинг истеъмол даражасини фақат гуручли шир гуручдан иборатлиги кўриниб турибди, шу билан биргаликда гуруч 111% - 107% га ортиқча истеъмол қилинган. Назорат остига олинган пациентларда ёз мавсумида узум, тарвуз ва қовун маҳсулотларининг истеъмол даражаси қисман камайтирилган, яъни 10-15 % га камлиги кузатилган. Мавжуд меваларнинг миқдори эса эркакларда 53,5%ни, аёлларда эса 51%ни ташкил қилди. Гўшт аҳолининг кунлик рациони таркибидаги энг асосий озиқ-овқат маҳсулотларидан бири ҳисобланади. Гўштнинг истеъмол даражаси ёз мавсумида эркакларда 75% ни, аёлларда эса 65%ни ташкил қилган. Бу эса пациентларда кун давомида 25-35% га камлигини кўрсатади. Бу темир таниқислик камқонлик касаллигини ривожланиши билан биргаликда вирусли касалликларнинг ортишига шароит яратади (2-жадвал).

2-жадвал

Беморларнинг куз мавсумида истеъмол қилган кунлик озиқ-овқат маҳсулотларини миқдорий даражаси

Маҳсулот	Физиологик меъёр		Мутлоқ истеъмол даражаси		%		Меъёрга нисбатан камлиги	
	Эркак	Аёл	Эркак	Аёл	Эркак	Аёл	Эркак	Аёл
Ун	20	20	$29,3 \pm 1,9$	$23,6 \pm 0,7$	146,5	118,0	+9,3	+3,6
Гуруч	50	45	$53,6 \pm 1,6$	$48,1 \pm 0,7$	107,2	106,9	+3,6	+3,1
Бўтқалар	20	20	$14,0 \pm 1,1$	$11,0 \pm 1,0$	70,0	55,0	-6,0	-9,0
Нон	250	220	$300,0 \pm 26,2$	$270,2 \pm 19,6$	120,0	122,8	+50,0	+50,2
Макарон	50	40	$52,4 \pm 1,6$	$49,1 \pm 1,5$	104,8	122,8	+2,4	+9,1
Картошка	220	200	$260,3 \pm 13,4$	$229 \pm 6,3$	118,3	114,5	+40,3	+29,0
Карам	50	50	$57,5 \pm 1,6$	$51,7 \pm 1,9$	115,0	103,4	+7,5	+1,7
Бодринг, помидор	100	100	$90,8 \pm 2,0$	$85,7 \pm 3,0$	90,8	85,7	-9,2	-14,3
Лавлаги ва сабзи	80	80	$72,5 \pm 2,2$	$69,2 \pm 3,4$	90,6	86,5	-7,5	-10,8
Бошқа сабзовот	60	60	$69,8 \pm 2,0$	$64,4 \pm 2,9$	116,3	107,3	+9,8	+4,4
Полиз экинлари	50	50	$45,0 \pm 1,6$	$40,0 \pm 1,7$	90,0	80,0	-5,0	-10,0
Қовоқ	30	30	$20,1 \pm 1,5$	$19,2 \pm 1,9$	67,0	64,0	-9,9	-10,8
Мевалар	250	250	$235,5 \pm 11,4$	$161,1 \pm 13,4$	94,2	64,4	-14,5	-88,9
Курит. мевалар	20	20	$16,7 \pm 1,3$	$13,7 \pm 1,4$	83,5	68,5	-3,3	-6,3

Узум	30	30	20,7±2,8	19,6±3,1	69,0	65,3	-9,3	-10,4
Цитрус мевалар	15	15	13,7±1,1	11,9±1,4	91,3	79,3	-1,3	-3,1
Мол гүшти	60	60	47,8±2,5	44,6±3,7	79,7	74,3	-12,2	-15,4
Қўй гўшти	30	20	25,4±1,1	14,4±1,3	84,7	72,0	-4,6	-5,6
Ич маҳсулотлари	8	5	7,0±1,3	4,1±1,3	87,5	82,0	-1,0	-0,9
Товуқ	70	60	63,1±2,1	52±3,1	90,1	86,7	-6,9	-8,0
Колбаса	25	15	30,7±1,1	17,9±2,2	122,8	119,3	+5,7	+2,9
Балиқ	35	35	31,8±2,0	24,8±2,1	90,8	70,9	-3,2	-10,2
Балиқ тузланган	8	3	5,5±1,0	2,0±1,0	68,8	66,7	-2,5	-1,0
Балиқ консерва	22	22	19,7±1,1	18,9±1,8	89,5	85,9	-2,3	-3,1
Сут	400	400	295±27,7	300±30	73,8	75,0	-105	-100
Сметана, қаймоқ	15	15	11,5±1,4	10,6±2,1	76,7	70,7	-3,5	-4,4
Хайвон ёғи	30	25	18,7±1,4	16,2±1,7	62,3	64,8	-11,3	-8,8
Сузма	25	20	22,2±1,1	19,6±1,1	88,8	98,0	-2,8	-0,4
Пишлоқ,	20	20	17,3±1,0	14,9±1,1	86,5	74,5	-2,7	-5,1
Тухум	1	1	2,5±1,0	1,0±1,0	250,0	100	+1,5	0
Шакар	30	20	35,7±1,6	28,9±2,9	119,0	144,5	+5,7	+8,9
Маргарин	5	5	9,1±1,2	9,1±1,2	182,0	182,0	+4,1	+4,1
Ўсимлик мойи	30	25	25±1,2	23,2±1,2	83,3	92,8	-5,0	-1,8
Мош	6	6	5,5±1,0	5,6±1,0	91,6	93,3	-0,5	-0,4
Ловия	6	6	5,5±1,0	5,5±1,0	91,6	91,6	-0,5	-0,5
Нўхат	8	8	5,1±1,0	5,6±1,0	63,8	70,0	-2,9	-2,4
Туз	5	5	7,8±1,1	7,2±1,0	156,0	144,0	+2,8	+2,2
Қандолат маҳс.	40	40	46±1,9	45±4,6	115,0	112,5	+6,0	+5,0

Ёз мавсумига нисбатан мева ва сабзовотларнинг қўшилишига қарамасдан, бугунги кунда беморларнинг куз мавсумидаги овқатланиш тартибида ун, макарон, нон ва нон маҳсулотларининг ортиқчалиги, гўшт ва балиқ маҳсулотлари, сут маҳсулотлари ва меваларнинг миқдори физиологик кўрсаткичларга мос келмайди. Ушбу ҳолат соғлом овқатланиш талаблари ва хавфсизлик назорати амалга оширилмаса, касалликнинг ривожланишига шароит яратади. Сир эмаски, белгиланган санитария меъёр ва қоидаларида турли бўёқли ичимликларнинг меъёри кўрсатилмаган. Назорат остига олинган bemорларнинг аксарияти ҳар куни энергетик ичимликлар, кола, фанта ва турли бўёқли ичимликларни истеъмол қилишганлиги аниқланган. Табиий мева ва сабзовотларнинг истеъмол даражаси камайтирилган. Бу эса bemорларнинг кунлик рациони таркибида В гуруҳ витаминаларнинг ва витамин А, С, D турларининг етишмаслиги билан биргаликда, минерал моддаларидан сут орқали тушадиган кальций, балиқ маҳсулотлари орқали тушадиган фосфор, бошқа минералларнинг тушишини камайши ва карбонсувлар миқдорининг ортишига шароит яратади. Тадқиқотимизнинг асосий вазифаларидан бири ёз-куз мавсумида bemорларнинг кунлик рациони таркибида оқсиллар, айниқса ҳайвон оқсилларининг етишмаслиги, озиқ-овқат маҳсулотлари билан организмга тушадиган витаминалар ва минераллар-

нинг етишмаслиги билан корреляцион боғлиқлигини асослашдан иборат бўлди. Кунлик рацион таркибида сут ва сут маҳсулотларининг; мева ва сабзовотларнинг етишмаслиги, касаллик хуружининг ортишига асос бўлган. Таъкидлаб ўтишимиз жоизки, йилнинг ёз-куз фаслларида bemорларнинг кунлик рационы ва унинг энергетик қўймати, асосан нон ва нон маҳсулотлари (гуруч, ун, макарон), шакар, туз, қандолат маҳсулотларидан шакар, печенье, турли ширинликларнинг ортиқчалиги касалликнинг ривожланишига асос бўлган. Олинган натижаларнинг таҳлилларини асослаш мақсадида, биз bemорларнинг кунлик рациони таркибидаги асосий микронутриентларнинг таъминланганлик даражасини баҳоладик. Биз микронутриентларни таҳлил қилишда иkkala жинсда йилнинг ёз-куз фаслларини алоҳида таҳлил қилдик, чунки гепатит касаллиги мавсумий кўтарилиш хусусиятига эга эканлигини инобатга олдик (3-жадвал).

Эркакларда асосий нутриентлардан оқсилларнинг истеъмол даражаси 62%-90,5%ни ташкил қилган, бироқ, ахолининг кунлик истеъмолида ҳайвон оқсилларининг миқдори кескин камайтирилган. Ёғларнинг миқдори 95,4% дан 132,5% гача ортиқча бўлиб, аксариятини ўсимлик мойлари ташкил қилган.

Карбонсувларнинг миқдори ёз-куз фаслларида 109%дан 143%гача, қувватмандлик миқдори эса 85%дан 119%га ортиқчалигини кўрсатиб турибди.

Соғлом овқатланиш талабларига мос келмайдиган овқатланиш тартиби эркак беморларнинг орасида

касалланиш даражаси ортишининг асосий мезонларидан бири ҳисобланади (4-жадвал).

3-жадвал

Сурункали гепатит билан хасталанган эркак bemorларнинг кунлик асосий озиқа моддаларининг кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Меъёр, г	Эркаклар, йил фасллари			
		Ёз	%	Куз	%
Оқсиллар, г	120	104,4	87,0	106,6	88,8
Ёғлар, г	120,5	114,9	95,4	132,5	109,9
Карбонсувлар, г	338,0	481,7	142,5	516,9	152,9
Кувват қиймати	3158,5	3393,9	107,5	3743,3	118,5
О:Ё:К нисбати	1:1:3	1:1,1:4,61		1:1,1:4,4	

4-жадвал

Сурункали гепатит билан хасталанган аёл bemorларнинг асосий озиқа моддаларининг кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Меъёр, г	Эркаклар, йил фасллари			
		Ёз	%	Куз	%
Оқсиллар, г	108,1	85,5	79,1	96,3	89,1
Ёғлар, г	109,3	86,1	79,6	100,3	91,8
Карбонсувлар, г	339,9	425,8	125,3	432,4	127,2
Кувват қиймати	2764,7	2833,3	102,5	3031,1	109,6
О:Ё:К нисбати	1:1:3	1:1:4,98		1:1:4,49	

Аёлларда асосий нутриентлардан оқсилларнинг истеъмол даражаси 69,3-96,3%ни ташкил қилган, оқсилларнинг асосий қисмини ўсимлик оқсиллари ташкил қилган. Ёғларнинг миқдори эса 79-92% гачани ташкил қилган, ёғларнинг асосий нисбати эса ўсимлик мойлари ҳисобига бойитилганлиги кўриниб турибди. Аёлларнинг кунлик рациони таркибида карбонсувларнинг миқдори эса ёз-куз фаслларида 105%дан 127%гача ортиқчалигини кўрсатиб турибди. Аёл bemorларнинг кувватмандлик эҳтиёжининг таҳлили шуни кўрсатадики, ёз мавсумида 102%га, куз мавусмида 110%га ортиқча таъминланган. Меъёрий кўрсаткичлардан кескин даражадаги карбонсувларнинг ортиқчалиги, кун давомидаги овқатланиш рационида ун, нон маҳсулотлари, макарон, шакар, ош тузи, қандолат маҳсулотларнинг, куз мавсумда узум миқдорининг ортиқчалиги иссиқ иқлим шароитидаги аҳоли орасида моддалар алмашинув касалликлари билан биргалиқда метаболик ўзгаришлар, қон босимининг ортиши, иммун тизимининг пасайиши билан биргалиқда сурункали гепатитнинг ривожланиши ва уларнинг асоратланишига шароит яратилганлигини кўрсатади.

Хуносалар

1. Сурункали гепатит билан хастланган bemorларнинг кунлик рациони таркибида уннинг миқдори йилнинг ёз-куз мавсумларида эркакларда 137%-156,0% кескин фасллар давомида ортиқчалиги, аёлларда эса 115%-142% ортиқчалиги аниқланган, бироқ, олий навли ундан тайёрланган ноннинг миқдори аналогик тартибида эркакларда 114,6%дан 123,6% гача, аёлларда 113,1% дан 131,8% га ортиқча

истеъмол қилинган. Мева ва сабзовотлар миқдорининг камайиши, касалликнинг зўрайишига боғлиқлиги асосланган.

2. Гўшт ва гўшт маҳсулотлари йил давомидаги истеъмол даражаси эркаклар ва аёлларда истеъмол миқдоридан камлигига қармасдан, колбас маҳсулотининг истеъмол миқдори эркакларда 112,2%дан 124,8% гача, аёлларда эса 117,3%дан 124%гача ортиқча эканлиги аниқланган. Сабзвотларнинг миқдори йил давомида иккала жинс пациентларда етарли эмаслиги, меваларнинг истеъмол даражаси ҳам йилнинг ёз-куз фаслларида кам истеъмол қилинган. Олинган натижалар шуни кўрсатадики, bemorларнинг нотўғри овқатланишининг кўрсаткичларидан кўриниб турибди, ортиқча тана вазни ($25,0-29,9 \text{ кг}/\text{м}^2$) 44(48,9%) нафар, семизлик 7(7,7%) нафар пациентларда қайд қилинди. Ўрганилган натижаларнинг таҳлиллари асосида таъкидлаш жоизки, пациентлар рационининг гигиеник талабларга мос келмаслиги, нафақат вирусли гепатитлар ва бошқа нутриентив таркиб билан боғлиқ касалликларнинг ривожланиши учун шароит яратиши ва касалликнинг авж олишига шароит яратиши мумкин.

Адабиётлар

1. «Аҳоли орасида микронутриент етишмаслиги профилактикаси тўғрисида»ги қонуни. Тошкент, 2010.-№.251.

2. Скурихина И.М., Тутельяна В.А. Химический состав российских продуктов: справочник/под ред.М.:Де Ли-принт.- 2002. -236 с.

3. СанМваҚ №0007-2020 «Ўзбекистон Республикаси аҳолисини ёшга, жинсга ва касбий фаолияти гурухлари учун соғлом овқатланиши таъминлашга қаратилган ўртacha

кунлик рационал овқатланиш нормалари» Ташкент, 2020.

4. Эрматов Н.Ж., Абдулхаков И.У. Кунлик рацион таркибидаги витаминларнинг қандли диабет билан хастланган беморларнинг овқатланишдаги тутган ўрни// Тиббиётда янги кун.- 2021.-№3. 246-256 б.

5. ЎзРҚ-483-1 «Озиқ-овқат маҳсулотларининг сифати ва хавсизлигини таъминлаш тўғрисида»ги қонуни. Тошкент, 2015.

6. Zokirxodjaev Sh.Ya., Shamuratova N.Sh., Duschanov B.A., Ruzmetova D.A., Raximova Sh.X. Biological and dietary value of sorgo (jugara) grain products by amino acid composition in certain diseases // American journal of medicine and medical sciences. 2021.- №11(3). -P. 261-264.

7. Zokirxodjaev Sh.Ya., Baxritdinov Sh.S., Xudayberganov A.S. Klinik dietologiya va nutritsiologiya // o'quv qo'llanma Toshkent: O'zkitob savdo nashriyot, 2021.-536 b.

8. Shamuratova N.Sh., Zokirxodjayev Sh. Y., Duschanov B.A., Ruzmatova D.A. Clinical-immunological efficiency in diethotherapy of chronic hepatitis with sorgo// Academicia Globe: Interscience Research, Open Access, Peer Reviewed Journal, 2022.-Vol.3, №.2.

9. Shaykhova G. I., Ermakov N.J., Abdullaeva D.G. To the problem of fungal pathology in the hot climate in children and adults./ International Journal of Pharmaceutical Research and entitled. -2021. Vol.13, №.1. -P. 2319-2322.

СУРУНКАЛИ ГЕПАТИТ БИЛАН ХАСТАЛАНГАН БЕМОРЛАРНИНГ ЁЗ-КУЗ МАВСУМИДАГИ КУНЛИК ОВҚАТЛАНИШ ТАРТИБИНИ ГИГИЕНИК БАҲОЛАШ

Шомуротова Н.Ш., Дусчанов Б.А.,
Зокирходжаев Ш.Я., Рўзметова Д.А.

Мақсад: сурункали гепатит билан оғриган bemorlarning кун давомида, уй шароитида истеъмол қилган ovқатланиш тартиби ва қунлик рационини гигиеник таҳлил қилиш. **Материал ва усуllibar:** 21 ёшдан 74 ёшгача бўлган 45 нафар bemor асосий гуруҳга ва назорат гуруҳига 45 нафар жигарнинг сурункали касалликлари билан хасталangan ва анъанавий даволанган bemorlar тадқиқот учун олинган бўлиб, уларнинг ҳақоний ovқатланиший ишленинг ёз-куз фаслида, статистик таҳлили учун 540 та таомнома шаклида ҳисоблаш ва лаборатор усуllibarida ўрганилиб баҳоланди. **Натижалар:** олий навли ундан тайёрланган ноннинг миқдори эркакларда 114,6% дан 123,6% гача, аёлларда 113,1% дан 131,8% гача ортиқча истеъмол қилинган, мева ва сабзавотларнинг истеъмол даражаси ишленинг ёз-куз фаслларида кам истеъмол қилинган. Беморларнинг нотўғри ovқатланиши кўрсаткичларидан кўриниб турибдики, ортиқча тана вазни 44(48,9%) нафар, семизлик 7(7,7%) нафар пациентларда қайд қилинди. **Хулоса:** меъёрий кўрсаткичлардан карбонсувларнинг ортиқчалиги аҳоли орасида моддалар алмашинувидаги метаболик ўзгаришилар, қон босимининг ортиши, иммун тизимининг пасайиши билан биргаликда сурункали гепатитнинг ривожланиши ва уларнинг асоратланишига шароит яратилганлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: овқатланиш, гигиеник таҳлил, сурункали гепатит, жигар циррози, ёз-куз фасли.