

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI FANLAR AKADEMIYASI

**NAZARIY va
KLINIK TIBBIYOT
JURNALI**



**JOURNAL
of THEORETICAL
and CLINICAL
MEDICINE**

Рецензируемый научно-практический журнал.

Входит в перечень научных изданий, рекомендованных ВАК Республики Узбекистан.

Журнал включен в научную электронную библиотеку и Российский Индекс Научного Цитирования (РИНЦ).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Главный редактор проф., акад. АН РУз Т.У. АРИПОВА

проф. Б.Т. ДАМИНОВ (заместитель главного редактора),
проф. Г.М. КАРИЕВ, проф. З.С. КАМАЛОВ, проф. Ш.Х. ЗИЯДУЛЛАЕВ
Р.З. САГИДОВА (ответственный секретарь)

2

ТАШКЕНТ – 2024

СОДЕРЖАНИЕ

ИММУНОЛОГИЯ И АЛЛЕРГОЛОГИЯ

Эшонов О.Ш., Ярашев А.Р. Оценка цитокинового статуса у больных с черепно-мозговой травмой на фоне противоотечной лимфотропной терапии

КЛЕТочНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И РЕГЕНЕРАТИВНАЯ МЕДИЦИНА

Адилов Ш.Ф., Жангаваров А.Ж., Рамзиддинов Ж.Ж., Рузимуродов Н.Ф. Опыт поэтапной гибридной реваскуляризации у пожилого пациента с генерализованным атеросклерозом

Адилов Ш.Ф., Рамзиддинов Ж.Ж., Жангаваров А.Ж., Рузимуродов Н.Ф. Хирургическое лечение медиальных переломов шейки бедренной кости с использованием моноклеарной фракции аутологичного костного мозга

ВНУТРЕННИЕ БОЛЕЗНИ

Атамуратов Б.Р., Фозилов Х. Г., Абдуллаева С.Я., Юлдашов Б.А., Эрметова А.М., Юлдашов А.А., Норбоев А.А., Абдужалитов С.А. Стентлаш амалиёти ёки тромболитизис бажарилган ST-элевацияли ўткир коронар синдромли беморларни бир йиллик кузатувининг қиёсий таҳлили

Киреев В.В., Суяров А.А., Хатамов Х.М. Современное состояние проблемы глюкокортикоидорезистентности: теория и практика (обзор)

Хамдамов Б.З., Худойбердиев С.С. Пути улучшения результатов лечения острой кишечной непроходимости у больных пожилого и старческого возраста

ПАТОГЕНЕЗ

Нишанов Ю.Н., Юлдашева М.Т., Кучкаров Ш.Б., Абдулазизова Ш.А. Морфоструктурные изменения региональных трахеобронхиальных лимфатических узлов при воздействии пестицидов

Нуралиев Н.А., Игамова О.К. Иммуноморфологические аспекты тимуса, как центрального органа иммунной системы (обзор)

Sobirova D.R., Usmanov R.D., Tairova S.F. Eksperimental qandli diabet bilan kasallangan laborator hayvonlarining o'pka to'qimasi va qon tomirlar tuzilishining morfologik o'zgarishi

Сыров В.Н., Эгамова Ф.Р., Гусакова С.Д., Сагдуллаев Ш.Ш. Результаты изучения иммуотропного действия гепалипина – фитокомпозиции, состоящий из эссенциальных фосфолипидов, глицирризиновой кислоты, экистерона и ликопина в норме и при вторичном иммунодефицитном состоянии у мышей с СС14-гепатитом в сравнении с фосфогливом

CONTENTS

IMMUNOLOGY AND ALLERGOLOGY

6 Eshonov O.Sh., Yarashev A.R. Assessment of cytokine status in patients with traumatic brain injury on the background of decongestant lymphotropic therapy

CELLULAR TECHNOLOGIES AND REGENERATIVE MEDICINE

9 Adilov Sh.F., Jangavarov A.J., Ramziddinov J.J., Ruzimurodov N.F. Experience of staged hybrid revascularization in an elderly patient with generalized atherosclerosis

12 Adilov Sh.F., Ramziddinov J.J., Zhangavarov A.J., Ruzimurodov N.F. Surgical treatment of medial fractures of the femoral neck with the use of mononuclear fraction of autologous bone marrow

GENERAL DISEASES

15 Atamuratov B.R., Fozilov Kh.G., Abdullayeva S.Ya., Yuldashov B.A., Ermetova A.M., Yuldashov A.A., Norboyev A.A., Abdujalilov S.A. Comparative analysis of one-year follow-up of patients with ST-elevation acute coronary syndrome who underwent stenting or thrombolysis

19 Kireev V.V., Suyarov A.A., Khatamov H.M. The current state of the problem of glucocorticoid resistance: theory and practice (review)

25 Khamdamov B.Z., Khudoyberdiev S.S. Ways of improving the results of treatment of acute intestinal obstruction in elderly and senile patients

PATHOGENESIS

31 Nishanov Yu.N., Yuldasheva M.T., Kuchkarov Sh.B., Abdulazizova Sh.A. Morphostructural changes of regional tracheobronchial lymph nodes under the influence of pesticides

35 Nuraliev N.A., Igamova O.K. Immunomorphological aspects of the thymus as a central organ of the immune system (review)

41 Sobirova D.R., Usmanov R.D., Tairova S.F. Morphological changes of lung tissue and structure of blood vessels of laboratory animals infected with experimental diabetes

44 Syrov V.N., Egamova F.R., Gusakova S.D., Sagdullaev Sh.Sh. The results of the study of the immunotropic effect of hepalipin, a phytocomposition consisting of essential phospholipids, glycyrrhizic acid, ecdysterone and lycopene in normal and secondary immunodeficiency in mice with CCl4 hepatitis in comparison with phosphogliv

UDK: 616.379-008.64:591.413/.415:591.4

EKSPERIMENTAL QANDLI DIABET BILAN KASALLANGAN LABARATOR HAYVONLARINING O‘PKA TO‘QIMASI VA QON TOMIRLAR TUZILISHINING MORFOLOGIK O‘ZGARISHI

Sobirova D.R.¹, Usmanov R.D.¹, Tairova S.F.²

¹Toshkent tibbiyot akademiyasi,

²Immunologiya va inson genomikasi institute, O‘R FA

РЕЗЮМЕ

Актуальность. Состояние дыхательной системы при сахарном диабете недостаточно изучено, при этом ключевую роль при диабете играет гипергликемия, которая отрицательно влияет на морфометрические показатели сосудистой стенки в легочной ткани.

Цель исследования. Изучение изменений в морфологии и морфометрии эндотелия легочных сосудов у крыс белой породы, вызванного сахарным диабетом в лабораторных условиях.

Материалы и методы. Экспериментальные исследования проводились на белых крысах без лабораторных пород. В условиях эксперимента крысы, с вызванным сахарным диабетом, были декапитированы в течение 60 дней. Были исследованы морфометрические изменения тканей легких и их кровеносных сосудов.

Результаты и обсуждение. Учитывая возникновение острых гемодинамических нарушений в спинном и нижнем отделах тканей легких и сосудов у больных сахарным диабетом, физиотерапевтические процедуры, улучшающие аэрацию в сегментах 2,6,8,9,10, следует начинать со дня выявления заболевания. В целях физиологического лечения, улучшающего аэрацию в аппарате «небулайзер» проводились дыхательные упражнения с увлажненным кислородом. Выявленные изменения — клинический морфологический диагноз, подтверждают проекцию темных пятен на нижних и задних частях МРТ.

Ключевые слова: аллоксан, диабетические крысы, сахарный диабет, эндотелий.

Bugungi kunda qandli diabet kasalligi giperqlikemiya bilan tavsiflangan surunkali metabolik kasallik, global sogʻliq uchun jiddiy yukdir [1,10]. Maʼlumki, diabet turli organlar tizimlariga taʼsir qiladi, bu yurak-qon tomir kasalliklari, neyropatiya, nefropatiya va retinopatiya kabi turli xil asoratlarni keltirib chiqaradi. Ushbu asoratlar orasida jigar bilan bogʻliq kasalliklar bemorning sogʻligʻi va farovonligiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi sababli tobora koʻproq eʼtiborga sazovor boʻldi. Oʻpka qon tomirlarining oʻzgarishi diabetda oʻpka patologiyasining muhim jihati boʻlib, oʻpka toʻqimalari ichidagi tomir devorining morfometrik koʻrsatkichlarini oʻrganish bu oʻzgarishlarni har tomonlama tushunish uchun juda muhimdir [2, 4, 14].

SUMMARY

Relevance. The state of the respiratory system in diabetes is not sufficiently studied, and hyperglycemia plays a key role in diabetes, which negatively affects the morphometric indicators of the vascular wall in the lung tissue.

Objective. Study of changes in pulmonary vascular endothelial morphology and morphometry in non-white rats caused by diabetes mellitus in a laboratory setting.

Materials and methods. Experimental studies were conducted on white rats without laboratory breeds. Under experimental conditions, diabetic rats were decapitated for 60 days. Morphometric changes in lung tissues and their blood vessels were investigated.

Results and conclusion. Considering the occurrence of acute hemodynamic disorders in the dorsal and lower lung and vascular tissues in patients with diabetes mellitus, physiotherapeutic procedures that improve aeration in segments 2,6,8,9,10 should be started from the day of detection of the disease. Here, for the purpose of physiological treatment, breathing exercises with saturated oxygen are carried out in the nebulizer apparatus, which improves aeration. Such changes are a clinical morphological diagnosis, confirming the projection of dark spots on the lower and posterior parts of the MRI.

Keywords: alloxan, diabetic rats, diabetes, endothelium.

Qandli diabet insulin etishmovchiligi yoki qarshilik natijasida kelib chiqadigan giperqlikemiya bilan tavsiflangan keng tarqalgan metabolik kasallik boʻlib, neyropatiya, retinopatiya va nefropatiya kabi turli xil asoratlarni keltirib chiqarishi mumkin. Nafas olish tizimi ham qandli diabetdan zararlanadi, bu oʻpka infeksiyalari, obstruktiv havo yoʻllari kasalliklari va interstitsial oʻpka kasalliklari kabi diabetik oʻpka kasalliklariga olib keladi [6,13,14]. Biroq, qandli diabetda oʻpka asoratlari haqida xabardorlik ortib borayotganiga qaramay, aniq mexanizmlar hali ham yaxshi oʻrganilmagan.

Tadqiqot maqsadi qandli diabetning tajribaviy tadqiqotlar uchun alloksan tetrahidratni yuborish orqali yaratilgan laboratoriya sharoitida chaqirilgan oq

zotsiz kalamushlarda o'pka tomirlari endoteliasining morfologiyasi va morfometriyasidagi o'zgarishlarni o'rganish.

MATERIALLAR VA USULLAR

Tajribaviy tadqiqotlar laboratoriya zotsiz oq kalamushlar ustida o'tkazildi. Ishda og'irligi 170-185 g bo'lgan 116 ta zotsiz oq kalamushlar olindi. Tajribaviy tadqiqotlarni olib borilishi uchun tajriba hayvonlarining qorin bo'shlig'iga bir marotaba alloksan asetat buferini 11 mg%/ 100 g tana massasiga nisbati yuborilib, qandli diabet chaqirildi hamda tajriba hayvonlari kam harakatchanlik, apatiya, befarqlik, poliuriya, vaznning kamayishi, yuzaki va tez-tez nafas olish, suyuqlikni ko'p-ko'p va tez-tez ichishi belgilari kuzatildi. 60 kunlik davrdagi zotsiz oq kalamushlar dekapitatsiya qilinib, o'pka to'qimasi va uning qon tomirlari tekshirish uchun olindi.

Eksperiment sharoitida qandli diabet chaqirilgan kalamushlar 60 kunlik davrda dekapitatsiya qilindi. Ajratib olingan o'pka to'qimasi va uning qon tomirlari bilan sog'lom o'pka to'qimasi va qon tomirlarini morfometrik o'zgarishlari tekshirildi.

Qandli diabetda o'pka to'qimasi va qon tomirlarni morfometrik tekshirishda (n=116) har xil davrdagi dekapitatsiya qilingan kalamushlar o'pka to'qimalaridan tayyorlangan mikropreparatlar olindi. Gematoksilin eozin bilan bo'yalgan to'qima komponentlarini chegaralari, tarkibiy hujayralari, qon tomir diametri, devorining anatomik qalinliklari, devori tarkibidagi o'zgarishlarga uchragan hujayralarning son va xajm birliklari o'rganildi. Olingan ma'lumotlar tahlilini ifodalash uchun 200x kattalikda NanoZoomer (REF C13140-21.S/N000198/HAMAMATSU PHOTONICS/431-3196 JAPAN)da skaner qilindi. O'zaro korrelyatsion bog'liqlari maxsus formulalar orqali inson omilisiz dasturiy ta'minot orqali ishlab chiqarildi.

TADDIQOT NATIJALARI

Ko'p qavatli kiprikli silindrsimon epiteliy nafas olish a'zolarini ichki yuzalarini shilliq qavatini epiteliysini qoplaydi. Hujayra populyatsiyasining 90 foizi uchta turdagi hujayralardan iborat: bazal hujayralar, kiprikli ustunli hujayralar va qadaqsimon hujayralar.

Bazal membrana nafas olish epiteliysini tashkil etuvchi ko'p qavatli, kiprikli epiteliyni ajratadi. Qadoqsimon hujayralari, kiprikli hujayralar, bazal hujayralar, diffuz neyroendokrin tizim hujayralari epiteliyni tashkil etuvchi 4 xil hujayra turidir. Bazal membrana bu hujayralarning har birini boshqalar bilan bog'laydi.

Tajribadagi zotsiz oq kalamushlarda 60 kun davomida alloksan qo'zg'atuvchi qandli diabetdan so'ng qon tomir bo'shlig'i keskin toraygan, endoteloid hujayralari shishganligi aniqlangan, distrofiya kuzatilgan, sitoplazmasi to'q pushti rangga bo'yalgan, yadrolari giperxrom bilan bo'yalgan. O'pka to'qimalarida keskin morfologik o'zgarishlar tufayli alveolyar kapillyarlar to'liq bo'lib ko'rindi. Ko'pchilik kapillyarlarda bazal membranalar shishgan, plazmatik shish tolali tuzilmalarni yo'q qiladi, endoteliy va bazal membrananing chegaralari

gialin va noaniq, o'tkir ko'payishning peritsit o'choqlari ko'p tarqalgan diffuzga aylangan. Prekapillyar arteriolalarda peritsit va gistiosit o'choqlari bo'lganligi uchun o'choqli ko'rinishga ega bo'lib, kapillyarlarning devorlarida keskin qalinlashuvi aniqlandi.

Ushbu o'zgarishlarga, ayniqsa, 2, 5, 6, 7 va 8 segmentlari ta'sir qiladi, ular kalamushlarda diafragma va umurtqa pog'onasi yaqinida joylashgan va kechiktirilgan gipoventiliyani namoyon qiladi. Endoteliy hujayralari cho'zilib boradi va ularning sitoplazmasida qora bazofil qo'shimchalar va glikogen qo'shimchalari borligi aniqlangan. Membrananing bo'yash intensivligi yuqoriroq va yadrosi giperxromli.

Devorning tolali tuzilmalarida ko'payish o'choqlari, plazmatik shish va kapillyardan oldingi arteriolalar va kapillyardan keyingi venulalarning peritsitlarida shikastlangan zigzagga o'xshash ko'rinishlar namoyon bo'ladi. Parchalangan tolali tuzilmalar perikitik qator bo'ylab va bazal qatlamni o'rab turgan tolalarning parallel taqsimlanishi bilan belgilanadi. Bu o'simtaning bir xil bazofil tuzilmalar bilan qoplangan yagona ob'ektga aylanganligini va kapillyar endoteliyning chegaralari bir-biriga kesib o'tganligini ko'rsatdi. Perikapillar shoxlardagi shishlar bir xil pushti rangga ega, plazma suyuqligi gialin ko'rinishga ega bo'ldi. Bir-biriga qaragan kapillyar bo'shliqdagi endotelotsitlar 1000 marta kattalashib, kapillyar bo'shliqni to'sib qo'yishi aniqlandi.

Segmentar areiolalar devori plazmatik bo'kish, intimasi gialinsimon ko'rinishda bo'lib, oralig'ida yakkam dukkam joylashgan hujayraviy tuzilmalar endotelotsitlarning shaklan cho'zinchoq ko'rinishi aniqlandi. Adventitsial qavatida oraliq shishlar, makrofaglar va kam miqdorda leykotsitlar aniqlanadi. Tolali tuzilmalari bo'kkan, xususiy tomirlari atrofida shishlar perimetri yaqqol ajraladi. Tomir atrofida fibroblastlarning multifokal proliferatsiya o'choqlari natijasida shakllangan angioskleroz o'choqlari, tomir perimetrini deformatsiyaga uchratganligiga olib kelgan. Segmentlar oralig'i vena qon tomirlari to'laqonli, o'rtacha ko'rinishda bo'lib, aksariyat bir xil ko'rinishda. Bo'lakchanning birlamchi, ikkilamchi va uchlamchi o'pka arteriyalari gistioarxitektonikasida o'zgarishlardan: intimasida subendotelial shishlar, tolali tuzilmalari to'rsimon ko'rinishda bo'lib, oraliqlarida eozinofil tuzilmalar aniqlanadi, shu sohalarida ko'piksimon hujayralarning subendotelial qavatlarida joylashganligi aniqlanadi. Intima yuzasini tashkil etgan endotelotsitlar yassi ko'rinishda bo'lib, yuzalarida bo'kkan endotelotsitlarning deskvamatsiyaga uchragan o'choqlari aniqlanadi. Mushak qavati keskin gipertrofiyalangan va miotsitlar oralig'ida shishli ko'rinishga ega bo'ldi. orasida yagona limfotsitlar aniqlanadi. Keskin gipertrofiyaga uchragan miotsitlar yadrosi giperxromli ko'rinishda bo'lib, tsitoplazmasida gialinli oqsil tuzilmalari aniqlanadi. Mushak qavati va adventitsiya qavatlarini oralig'ida plazmatik bo'kish o'choqlari yaqqol tasvirlangan, seroz pardasi qalinlashgan ko'rinishda ekanligi kuzatildi.

XULOSA

Qandli diabet bilan xastalangan bemorlar oʻpka toʻqimasi va qon tomirlarida dinamikada orqa va pastki boʻlaklarida keskin gemodinamik buzilishlarning yuzaga kelishini inobatga olgan holda 2, 6, 8, 9, 10 segmentlarda aeratsiyani yaxshilovchi fizioterapevtik muolajalarni qilishni kasallik aniqlangan kundan boshlash kerak. Bu erda fiziologik davolash maqsadida aeratsiyani yaxshilovchi “nebulayzer” apparatida namlantirilgan kislorod oqimi bilan nafas olish mashqlari amalga oshiriladi. Bu kabi oʻzgarishlarni klinik morfologik tashhisi boʻlib, MRTda aniqlangan pastki va orqa boʻlaklarda toʻq rangli oʻchoqlar proektsiyasi tasdiqlaydi.

ADABIYOTLAR

1. Абдурахимов А. Х. и др. Роль сахарного диабета в развитии поражения почек при COVID-19. // *Re-health journal*. – 2022. – №. 2 (14). – С. 107-118.
2. Авезов Д. К. и др. Клинико-функциональный статус сердечно-сосудистой системы у пациентов с хронической обструктивной болезнью легких с COVID-19. // *Интернаука*. – 2021. – №. 20-2. – С. 15-16.
3. Айтынова А. и др. Исследование влияния сорбента на основе лигнина на течение метаболического синдрома и сахарного диабета. // *Известия НАН РК. Серия биологическая и медицинская*. – 2021. – №. 4. – С. 14-30.
4. Акимцева Е.А., Котовщикова Е.Ф. Маркеры эндотелиальной дисфункции как предикторы развития ретромбозов коронарных стентов. // *Фундаментальные исследования*. 2012;2(8):271–273. [А]
5. Алексеевко Е.А., Быков И.М., Луконин И.А. Нарушения окислительного метаболизма у больных с сахарным диабетом 2-го типа и заболеваниями органов дыхания. // *Кубанский научный медицинский вестник*. – 2017. – №. 1. – С. 7-11.
6. Апрятин С. А. и др. Характеристика высокосахарозной *in vivo* модели метаболического синдрома у инбредных, аутбредных линий и тетрагибрида мышей по интегральным, метаболомным и морфологическим показателям // *Профилактическая медицина-2017*. – 2017. – С. 55-61.
7. Болеева Г. С., Мочалов С. В., Тарасова О. С. Функциональные изменения артериальных сосудов при экспериментальном сахарном диабете I типа // *Успехи физиологических наук*. – 2014. – Т. 45. – №. 2. – С. 20-36.
8. Брындина И. Г., Васильева Н. Н. Сурфактантная система легких крыс с различной стресс-устойчивостью при аллоксановом диабете в условиях введения даларгина // *Вестник Тверского государственного университета. Серия: Биология и экология*. – 2013. – №. 29. – С. 41-47.
9. Брюхин Г. В., Антонов С. Д. Характеристика сперматогенного эпителия семенников половозрелого потомства самок крыс с экспериментальным сахарным диабетом I-го типа при действии иммобилизационного стресса // *Научно-практический рецензируемый журнал Клиническая и экспериментальная морфология*. – 2019. – Т. 8. – №. 3. – С. 48-54.
10. Wei YM, Yan J, Yang HX. Identification of severe gestational diabetes mellitus after new criteria used in China. // *J Perinatol*. 2016 Feb;36(2):90-4.
11. Wimmer RA, Leopoldi A, Aichinger M, Wick N, Knoblich JA, Kerjaschki D, Penninger JM. Human blood vessel organoids as a model of diabetic vasculopathy. // *Nature*. 2019 Jan;565(7740):505-510.
12. Wynn TA, Vannella KM. Macrophages in Tissue Repair, Regeneration, and Fibrosis. *Immunity* (2016) 44(3):450–62.]
13. Yang J, Agarwal M, Ling S, Teitz-Tennenbaum S, Zemans RL, Osterholzer JJ, et al.. Diverse Injury Pathways Induce Alveolar Epithelial Cell CCL2/12, Which Promotes Lung Fibrosis. // *Am J Respir Cell Mol Biol* (2020) 62(5):622–32.
14. Zhang H, Dellsperger KC, Zhang C. The link between metabolic abnormalities and endothelial dysfunction in type 2 diabetes: an update. // *Basic Res Cardiol*. 2012;107(1):237
15. Zhao YZ, Xu YY, Li X, Lu CT, Zhang L, Dai DD, Sun CZ, Lv HF, Li XK, Yang W. An in vivo experiment to improve pulmonary absorption of insulin using microbubbles. // *Diabetes Technol Ther*. 2011 Oct;13(10):1013-21