

CRR  
JOURNAL  
OF CARDIORESPIRATORY RESEARCH

ISSN 2181-0974  
DOI 10.26739/2181-0974



Journal of  
**CARDIORESPIRATORY**  
**RESEARCH**

Special Issue 1.1

**Халметова Ф.И.**  
Ташкентская медицинская академия,  
Ташкент, Узбекистан

## СУСТАВНОЙ СИНДРОМ У БОЛЬНЫХ С РЕАКТИВНОМ АРТРИТОМ: РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ



<http://dx.doi.org/10.26739/2181-0974-2022-SI-1-1>

**Актуальность.** Одним из наиболее часто встречающихся среди хронических воспалительных заболеваний суставов является реактивный артрит (РеА). За последние 10 лет отмечена общемировая тенденция к увеличению заболеваемости реактивным артритом более чем в 2.5 раза и составляют около 15% пациентов ревматологических стационаров. **Цель работы.** Оценить характер суставного синдрома у больных с реактивным артритом. **Материалы и методы.** Материалом исследования были истории болезни больных 3-клинической городской больницы, госпитализированные по поводу реактивного артрита в течении 2016-2021гг. Проведен ретроспективный анализ анамнестических данных 300 больных. Все обследованные больные были разделены на две группы. Первую группу (I) составили 211 (62,2%) больных мужского пола и вторую группа (II) – 89 (37,8%) больных женского пола. Средний возраст составил  $35,81 \pm 3,38$  года. **Результаты.** В результате экспертного анализа историй болезни было выявлено наиболее длительное существование РеА – 3 и более лет у 168 больных (56%), 1-2 года у 93 больных (31%) и до года у 39 больных (13%), что характеризует необходимость в стационарном лечении больных с более длительном существованием РеА в анамнезе. Артралгия – в I группе наблюдалось у 99 больных (47,2%), во II группе у 34 больных (38,6%). Припухлость суставов наблюдалась в первой и во второй группе у больных с артралгией 243 (81,1%) и 57 (54,5%) соответственно. Количество лиц со деформацией суставов было больше в 2.5 раза чем с деформацией суставов. С ограничением движений больных составило в первой группе 120 (57,2%) и во второй группе 31 (35,4%), утренняя скованность наблюдалась чаще в первой группе – 124 больных (59,1%) со спондилоартритом. Наряду с поражением суставов, у больных РеА отмечалось вовлечение в воспалительный процесс мест прикрепления сухожилий, связок и суставных капсул к кости -энтезитов, наиболее частыми из которых были ахиллобурсит и подпяточный бурсит.

**Заключение.** Таким образом при диагностике реактивного артрита необходимо обращать внимание на длительность заболевания и поражение суставов, так как эти данные влияют на дальнейшую тактику и развитие ранних осложнений реактивных артритов.



