



# XXI ВЕК: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ  
ОНЛАЙР-КОНФЕРЕНЦИЯ

**СБОРНИК  
ТЕЗИСОВ**

ТАШКЕНТ

ISBN 978-9943-8123-9-0



9 789943 812390

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
ТАШКЕНТСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ**

**НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**XXI ВЕК: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД  
НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - II**

**26 мая 2022.**

**ТАШКЕНТ**

**УДК: 615.6:331**

**ББК 88.2я**

**Д 22**

**Сборник тезисов Научно-практической конференции. XXI век: современный взгляд на психическое здоровье - II.** –Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2022. 272 с.

**ISBN 978–9943–8123–9–0**

В развитых странах психические расстройства играют все большую роль в утрате трудоспособности работающего населения, а экономические потери в связи с этим неуклонно возрастают. Нарушения психического здоровья в качестве причины преждевременной утраты трудоспособности опережают сердечнососудистые, онкологические и костно-мышечные заболевания.

Коллектив кафедры Психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии и психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института организовала данную конференцию в продолжение цикла проводимых онлайн-конференций «XXI век: современный взгляд на психическое здоровье - II». Целью проведения данной конференции является необходимость освещения наиболее насущных вопросов современной психиатрии, взаимодействия психологических дисциплин.

Сборник тезисов конференции посвящен актуальным вопросам по детской психиатрии, клинической психологии, проблемам аддиктивных и поведенческих расстройств.

Коллектив авторов: сотрудники кафедры - Абдуллаева В.К., Сулейманов Ш.Р., Шарипова Ф.К., Бабарахимова С.Б., Рустамова Ж.Т., Ганиханов А.А., Нурходжаев С.Н., Насыров А.А., Туйчиев Ш.Т., Сагтаров Т.Ф., Матвеева А.А., Рогов А.В., Мухтаров Б.А., Ирмухамедов Т.Б., Аббасова Д.С., Султанова К.Б.

#### **РЕЦЕНЗЕНТЫ:**

**Султанов Ш.Х.** – руководитель 3-го терапевтического направления Ташкентского государственного стоматологического института, д.м.н., доцент

**Абдуллаева В.К.** – заведующая кафедрой Психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии и психологии Ташкентского педиатрического медицинского института

**УДК: 615.6:331**

**ББК 88.2я**

**ISBN 978–9943–8123–9–0**

имели 8 чел. (20%), 2 чел. (5%) - занимались воспитанием детей, с родителями проживали 32 чел. (80%). На протяжении катамнеза получена противоположная динамика с ухудшением клинико-социальных показателей в традиционной системе помощи и увеличение сравнительной эффективности помощи у больных, получающих помощь по программе первого психотического эпизода. Нарастание изменений показателей и обнаружение усиления нейрокогнитивного дефицита в группах с симптомами шизофрении, со стороны и увеличение различий по клиническим и социальным параметрам.

## **АНАЛИЗА БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ ПОЛИМОРФНЫМИ ПСИХОТИЧЕСКИМИ РАССТРОЙСТВАМИ**

*Умаров Х.П., Ашууров З.Ш., Ражабов М.Н.  
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан, Ташкент*

**Актуальность.** В современных моделях психических заболеваний в качестве ключевого механизма заболевания рассматривают функциональное разобщение нейронных сетей. Это подтверждается данными нейровизуализации и анализа биоэлектрической активности мозга. Наиболее информативным методом оценки межкорковых связей является когерентный анализ ЭЭГ.

**Цель исследования** состояла в определении с помощью когерентного анализа ЭЭГ нейродинамических показателей у пациентов с острым полиморфным психотическим расстройством, в период манифестного психоза и в ремиссии.

**Материал и методы исследования.** Обследованы пациенты с острым полиморфным психотическим расстройством (F23) при первом эпизоде заболевания (давность заболевания до 3 лет, n=16) – группа 1 и на отдаленном этапе ремиссии (давность заболевания 5 лет и более, n=17) – группа 2.

**Результаты.** У больных первой группы усредненные по группе между отдельными корковыми зонами ЭЭГ варьировали в диапазоне от 0,71 до 0,07. Наиболее высокие значения (выше 0,6) выявлены между симметричными лобными, центральными и теменными корковыми зонами. У второй группы больных величина в разных корковых зонах варьировала от 0,76 до 0,15. Наибольшие значения (0,76 – 0,6) выявлены, как и у первой группы, между симметричными кор-

ковыми зонами – фронтальными (F3-F4), центральными (C3- C4), теменными (P3-P4), а кроме того – между затылочными областями (O1-O2).

**Выводы.** Применение когерентного анализа ЭЭГ позволило выявить у больных с острым полиморфным психотическим расстройством особую мозаику межкорковых взаимодействий в виде общего снижения числа и эффективности связей. Когерентный анализ ЭЭГ позволяет дифференцированно подходить к оценке функциональной активности различных корковых зон и их участия в интегративной деятельности мозга, выявляя определенные звенья в структуре патологической системы. Динамика параметров когерентности в период становления ремиссии служит объективным показателем усиления межкорковой интеграции.

## **КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПСИХИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ**

*Умуров Н.А., Абдуллажанова Ш.Ж., Ражабов М.Н.  
Ташкентская медицинская академия, Узбекистан, Ташкент*

**Цель исследования.** Проведение сравнительного анализа клинических проявлений и динамики психического состояния у медицинского персонала и пациентов больницы, переболевших COVID-19.

**Материал и методы.** Представлены данные обследованных лиц за 10-ти месячный период для обоснования психиатрической и психотерапевтической помощи пациентам, болеющим и переболевшим COVID-19. Исследование было направлено на оценку психического состояния медработников и пациентов, госпитализированных в больницу во время первой и второй волны пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19. Проведен сравнительный анализ психического состояния двух групп лиц (120 чел.), перенесших COVID-19 разной степени тяжести. Первую группу из 60 чел. составил медперсонал, вторую – 60 чел. пациенты больницы. Среди исследованных лиц первой группы: мужчин было 32 чел. (53.3%), женщин – 28 (46.6%). Лиц старше 40 лет было 34 (56.6%). Из них мужчин – 18 (45%), женщин – 16 (47%). Среди исследованных лиц второй группы: мужчин было 42 чел. (70%), женщин – 18 (30%). Все мужчины и женщины второй группы были старше 40

<b>Ражабов М.Н., Ашуров З.Ш., Ядгарова Н.Ф.</b> Рухий беморларда алкоголь қабул қилиш натижасидаги хавотирли бузилишлар.....	187
<b>Рахматуллаев А.И.</b> Особенности клинической симптоматики пубертатных дисморфофобий .....	188
<b>Рустамова Ж.Т.</b> Определение подросткового буллинга и его ключевые характеристики.....	192
<b>Рустамова Ж.Т.</b> Причины и факторы риска подросткового буллинга.....	197
<b>Рустамова Ж.Т.</b> О некоторых прогностических факторах течения эпилепсии .....	200
<b>Савушкина А.И., Рощина И.Ф., Солохина Т.А.</b> Модель психического и самостигматизация больных шизофренией.....	204
<b>Саттаров Т.Ф., Нурходжаев С.Н., Бабарахимова С.Б.</b> Этические и деонтологические особенности подготовки специалистов в области психиатрии и медицинской психологии .....	207
<b>Ситникова Э.О., Чупрунова М.А., Шестакова Е.С.</b> Смысл-жизненные ориентации как фактор выгорания студентов в процессе обучения.....	212
<b>Сулейманов Ш.Р., Шарипова Ф.К., Абдуллаева В.К., Бабарахимова С.Б.</b> Клинических формы депрессивной симптоматики у подростков .....	216
<b>Султонова К.Б., Шарипова Ф.К.</b> Эффективность арт-терапии для редукции эмоциональных нарушений у подростков с сахарным диабетом I типа.....	221
<b>Талипова Н.Ш., Магзумова Ш.Ш.</b> Особенности аффективного состояния у больных с нарушением пищевого поведения, ассоциированного с ожирением.....	225
<b>Туйчиев Ш.Т., Абдуллаева В.К., Набиева У.П.</b> Распространенность тревоги при пост COVID-19 синдроме.....	227
<b>Умаров Х.П., Ашуров З.Ш., Ражабов М.Н.</b> Особенности нейрофункциональных изменений у пациентов с острым полиморфным психотическим расстройством.....	228
<b>Умаров Х.П., Ашуров З.Ш., Ражабов М.Н.</b> Анализа биоэлектрической активности мозга у больных с острыми полиморфными психотическими расстройствами.....	230
<b>Умуров Н.А., Абдуллажанова Ш.Ж., Ражабов М.Н.</b> Клинические особенности психических нарушений в период пандемии короновирусной инфекции.....	231