



XXI ВЕК: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ



МЕЖДУНАРОДНАЯ НАЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
ОНЛАЙР-КОНФЕРЕНЦИЯ

**СБОРНИК
ТЕЗИСОВ**

ТАШКЕНТ

ISBN 978-9943-8123-9-0



9 789943 812390

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ**

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

**XXI ВЕК: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - II**

26 мая 2022.

ТАШКЕНТ

УДК: 615.6:331

ББК 88.2я

Д 22

Сборник тезисов Научно-практической конференции. XXI век: современный взгляд на психическое здоровье - II. –Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2022. 272 с.

ISBN 978–9943–8123–9–0

В развитых странах психические расстройства играют все большую роль в утрате трудоспособности работающего населения, а экономические потери в связи с этим неуклонно возрастают. Нарушения психического здоровья в качестве причины преждевременной утраты трудоспособности опережают сердечнососудистые, онкологические и костно-мышечные заболевания.

Коллектив кафедры Психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии и психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института организовала данную конференцию в продолжение цикла проводимых онлайн-конференций «XXI век: современный взгляд на психическое здоровье - II». Целью проведения данной конференции является необходимость освещения наиболее насущных вопросов современной психиатрии, взаимодействия психологических дисциплин.

Сборник тезисов конференции посвящен актуальным вопросам по детской психиатрии, клинической психологии, проблемам аддиктивных и поведенческих расстройств.

Коллектив авторов: сотрудники кафедры - Абдуллаева В.К., Сулейманов Ш.Р., Шарипова Ф.К., Бабарахимова С.Б., Рустамова Ж.Т., Ганиханов А.А., Нурходжаев С.Н., Насыров А.А., Туйчиев Ш.Т., Сагтаров Т.Ф., Матвеева А.А., Рогов А.В., Мухтаров Б.А., Ирмухамедов Т.Б., Аббасова Д.С., Султанова К.Б.

РЕЦЕНЗЕНТЫ:

Султанов Ш.Х. – руководитель 3-го терапевтического направления Ташкентского государственного стоматологического института, д.м.н., доцент

Абдуллаева В.К. – заведующая кафедрой Психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии и психологии Ташкентского педиатрического медицинского института

УДК: 615.6:331

ББК 88.2я

ISBN 978–9943–8123–9–0

КЛИНИКО-ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРЫ АФФЕКТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА

*Шадманова Л.Ш., Ядгарова Н.Ф., Зокиров М.М.
Ташкентская медицинская академия*

Анализ научной литературы по проблемам депрессий является одной из центральных в области психиатрии. Это определяется, в первую очередь, высокой их распространенностью в инволюционном возрасте частота депрессий среди других форм психической патологии неуклонно растет по мере старения. В процессе старения наблюдаются возрастные изменения практически всех нейротрансмиттерных систем, предположительно участвующих в патогенезе депрессий, однако время появления этих изменений в процессе старения и скорость их прогрессирования неодинаковы, что может определять особенности патогенеза депрессий в разные периоды позднего возраста.

Цель исследования: Изучение клинико-психопатологических особенностей структуры аффективных расстройств у больных пожилого возраста

Материалы и методы: Обследовано 40 больных с депрессивными расстройствами в возрасте от 55-65 лет. Средний возраст составил 55,9 год. Среди них было 31 женщины (68,8%), и 14 мужчин (31,1%). Из методов исследования использовались клинико-психопатологический; экспериментально-психологический методы исследования (шкала для оценки депрессии DRALOX (2012), психометрическая шкала Гамильтона).

Все больные прошли стационарный курс лечения в Городской Клинической Психиатрической больнице Городского Управления Здравоохранения Хокимията г. Ташкента.

Результаты исследования

В структуре выявленных депрессий преобладали психогенные расстройства - 62,2 %. Преобладание депрессий легких и средней тяжести - 20,4 балла по шкале Гамильтона - отмечено у пациентов пограничном отделением. Исследование у больных выявило достоверное превышение показателей соматической, обсессивно-компульсивной, депрессивной, тревожной, паранойяльной шкал, а также

дополнительной шкалы депрессии ($p < 0,05$). Высокий показатель соматической шкалы отражает дистресс, возникший из ощущения телесной дисфункции. В конкретном случае это связано как с наличием расстройств аффективного круга, так и с наличием и проявлением реальных соматических заболеваний.

Выводы

Выявление большого числа пациентов позднего возраста с депрессивными расстройствами подтверждает результаты предыдущих исследований, свидетельствующие о недостаточной диагностике аффективных расстройств. Факт невыявления депрессии обусловлен следующими причинами: сочетание аффективного расстройства и соматического заболевания; невыраженность депрессий; особенности возрастных психических изменений; излишняя психологизация депрессивных жалоб.

ФАКТОРЫ РИСКА РАЗВИТИЯ ДЕПРЕССИВНЫХ РАССТРОЙСТВ В ИНВОЛЮЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

*Шадманова Л.Ш., Ядгарова Н.Ф., Зокиров М.М.
Ташкентская медицинская академия*

Целью исследования является изучение факторов риска в формировании и развитии депрессивных состояний инволюционного периода.

Материалы и методы исследования.

Обследовано 40 больных с депрессивными расстройствами в возрасте от 45-60 лет. Из методов исследования использовались клинико-психопатологический; экспериментально-психологический методы исследования (шкала для оценки депрессии DRALOX (2012), психометрическая шкала Гамильтона). Для достижения поставленной цели и решения задач исследования проведено обследование 45 больных с депрессивными расстройствами в возрасте 45-65 лет. Средний возраст составил 55,9 год. Среди них было 31 женщины (68,8%), и 14 мужчин (31,1%). Все больные прошли стационарный курс лечения в Городской Клинической Психиатрической больнице Городского Управления Здравоохранения Хокимиата г. Ташкента.

Результаты исследования

Для группы психогенных депрессий более высокое значение имели следующие факторы. Наиболее значимое хроническое сома-

| | |
|---|-----|
| Умуров Н.А., Шадманова Л.Ш., Ражабов М.Н. Клинические особенности психических нарушений в период пандемии коронавируса инфекции..... | 234 |
| Хайрединова И.И., Ядгарова Н.Ф., Лян Е.М., Таджибаев А.А. Интегральная оценка факторов формирования сочетанной зависимости от гашиша и трамадола..... | 236 |
| Хайрединова И.И., Ядгарова Н.Ф., Лян Е.М., Таджибаев А.А. Основные факторы риска формирования полизависимости..... | 239 |
| Хайретдинов О.З., Рубакова Л.И. Современные возможности психиатрической клиники: применение цифровых технологий | 241 |
| Khairatdinov O.Z. Experience in conducting telemedicine consultations in a children's psychiatric hospital..... | 244 |
| Кенжаева Н.К., Халикова И.К. Некоторые аспекты медицинского наркологического обследования лиц, вступающих в брак..... | 245 |
| Xolmo‘minov A.E., Vosiqov B.A., Otajonov Z.M., Nakiyeva G.M. COVID-19 pandemiyasining tibbiyot oliy o‘quv yurtlari talabariга neyropsixologik ta’siri..... | 247 |
| Шадманова Л.Ш., Ядгарова Н.Ф., Зокиров М.М. Клинико-психопатологические особенности структуры аффективных расстройств у больных пожилого возраста..... | 249 |
| Шадманова Л.Ш., Ядгарова Н.Ф., Зокиров М.М. Факторы риска развития депрессивных расстройств в инволюционном периоде..... | 250 |
| Шадманова Л.Ш., Ядгарова Н.Ф., Зокиров М.М., Ражапов М.Ш., Васиков Б.А. Особенности аффективных расстройств у лиц пожилого возраста с органическими заболеваниями головного мозга..... | 251 |
| Шадров Е. К. Султанова А. Н. Профилактика геймерства и компьютерной зависимости..... | 253 |
| Шалина Н.С. Балакирева Е.Е., Куликов А.В., Коваль-Зайцев А.А., Никитина С.Г., Блинова Т.Е., Шушпанова О.В. Виды агрессивного поведения при аутизме у детей..... | 256 |
| Шин З.В. Концепции психотерапевтической коррекции социально-когнитивных нарушений при шизофрении..... | 259 |
| Шлойдо Д.Е. Эффективные методы профилактики расстройств пищевого поведения..... | 261 |
| Yadgarova N.F., Shadmanova L.Sh. Depressiya kuzatilgan bemorlarda kognitiv-hulq atvor psixoterapiya samaradorligini baholash... | 263 |