



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI  
TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI



**«ICHKI KASALLIKLARNI DIAGNOSTIKASI  
VA DAVOLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI»  
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI  
TEZISLAR TO'PLAMI**

**2022 yil 17 may**

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ  
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ  
«АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ  
И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ  
ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ»**

**17 мая 2022 г.**

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI  
TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI

**«ICHKI KASALLIKLARNI DIAGNOSTIKASI  
VA DAVOLASHNING DOLZARB MUAMMOLARI»  
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMANI  
TEZISLAR TO'PLAMI  
17 MAY 2022 YIL, TOSHKENT**



**СБОРНИК ТЕЗИСОВ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ  
КОНФЕРЕНЦИИ «АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ  
И ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ВНУТРЕННИХ ОРГАНОВ»  
17 МАЯ 2022 ГОДА, ТАШКЕНТ**

## ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ЭСТРОГЕННО-ТЕСТОСТЕРОНОВЫЙ БАЛАНС КАК ФАКТОР РИСКА АБУЗУСНОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ У ВЗРОСЛЫХ

РАХИМОВА Ш.М., САИДВАЛИЕВ Ф.С., РАХИМОВА Г.М.

Ташкентская медицинская академия, Ташкент Узбекистан

**Цель исследования.** Изучить взаимосвязь между пренатальным воздействием эстрогена и тестостерона после соотношения цифр 2D:4D и распространенность АГБ у взрослых.

**Материалы и методы исследования.** Мы обследовали группы состоящих из 28 взрослых (6 мужчины, 22 женщины в возрасте 32–44 лет) с АГБ и контрольную группу из 23 взрослых (9 мужчин, 14 женщин в возрасте 34–46 лет). Соотношение цифр 2D:4D на обеих руках измеряли с помощью скользящего штангенциркуля.

**Результаты.** Достоверные различия были обнаружены в правой руке. Женщины, страдающие с АГБ, имели более низкое значение отношения 2D:4D, чем контрольная группа, а правое 2D:4D было ниже, чем левое 2D:4D

(Δ2D:4D), что свидетельствует о пренатальном доминировании тестостерона. Противоположная зависимость наблюдалась у мужчин с АГБ и было более высокое значение отношения 2D:4D. Δ2D:4D было больше, чем в контрольной группе, что свидетельствует о пренатальном доминировании эстрогена.

**Выводы.** В зависимости от пола разная пропорция пренатальных половых стероидов может быть фактором риска АГБ у взрослых. Женщины с АГБ предположительно подвергались воздействию в пренатальной жизни более высоких уровней тестостерона по сравнению с эстрогеном, в то время как мужчины с АГБ, подвергались воздействию более высоких уровней эстрогена по сравнению с тестостероном.

## ИНДОМЕТАЦИНЛИ ГАСТРОПАТИЯДА МЕЪДАНИНГ ШИЛЛИҚ ТҮСИҒИ ҲОЛАТИГА ПРОТОН ПОМПА ИНГИБИТОРЛАРИ, ЦИТОПРОТЕКТОРЛАР ВА УЛАРНИНГ КОМБИНАЦИЯЛАРИ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ

РАХМАТУЛЛАЕВА Г.К., ЯКУБОВ А.В., ХАМРАЕВ А.А.

Тошкент тиббиёт академияси, Тошкент, Ўзбекистон

**Тақиқот максади.** Индометацинли гастропатияда меъданинг шиллиқ түсиги ҳолатига протон помпа ингибиторлари, цитопротекторлар ва уларнинг комбинациялари таъсирини ўрганиш

**Материаллар ва усуллар.** Ревматологик патологияси бўлмаган ИГ чақирилган ҳайвонларда препаратлар қўлланилганда меъда шилиқ қавати ҳолатини баҳолаш мухим эди. Шунинг учун ИГ моделини соғлом жинсий етук, эркак каламушларда чақирдик. Тажрибалар тана вазни 150–200 г бўлган 2 та серияда, 168 та оқ каламушларда олиб борилди. Биокимёвий текширувлар 14 та груп ҳайвонларда амалга оширилди. 1 груп – интакт; 2 груп – индометацинли гастропатия (ИГ) чақирилган ҳайвонлар; 3 груп – ИГ чақирилган ва 10 кун давомида дистиллирланган сув олган каламушлар (даволаниш йўқ); 4 груп – ИГ чақирилган ва 10 кун давомида омепразол олган каламушлар; 5 груп – ИГ чақирилган ва 10 кун давомида рабепразол олган каламушлар; 6 груп – ИГ чақирилган ва 10 кун давомида де-нол олган каламушлар; 7 груп – ИГ чақирилган ва 10 кун давомида сукралфат олган каламушлар; 8 груп – ИГ чақирилган ва 10 кун давомида пепсан-Р олган каламушлар; 9 груп – ИГ чақирилган ва 10 кун давомида омепразол + денол олган каламушлар; 10 груп – ИГ чақирилган ва 10 кун давомида омепразол + сукралфат олган каламушлар; 11 груп

– ИГ чақирилган ва 10 кун давомида омепразол + пепсан-Р олган каламушлар; 12 груп – ИГ чақирилган ва 10 кун давомида рабепразол + денол олган каламушлар; 13 груп – ИГ чақирилган ва 10 кун давомида рабепразол + сукралфат олган каламушлар; 14 груп – ИГ чақирилган ва 10 кун давомида рабепразол + пепсан-Р олган каламушлар.

**Натижалар.** ИГда индометацин шиллиқ түсиги ва унинг компоненти бўлган (ЭГП) эримайдиган гликопротеинлар синтезини жиддий тарзда пасайтиради. Бу груп ҳайвонларида меъда шиллиғи супензиясида сиал кислоталари ва фукозанинг деярли 3 марта, умумий оқсилнинг 1,5 маротабадан кўпроқ пасайишини кузатдик. Омепразол қўлланилганда аниқладик-ки, препарат ЭГП синтезини сусайтиради. Бу гурухда, даволаш олиб борилмаган гурухга ( $\text{IG} + \text{H}_2\text{O}$ ) солиштирганда, сиал кислоталарининг 40,6% га, фукозанинг 39,0% га, умумий оқсилнинг 27,4% га камайишини кузатдик. Рабепразол қўлланилганда бироз бошқачароқ характердаги таъсири қайд қилдик. Бу гурухда препарат ЭГП синтезига стимулловчи самара кўрсатади. Сиал кислоталари миқдорининг 62,2%, фукозанинг 106,9% ва умумий оқсилнинг 35,7% га ошишини кузатдик. Игни де-нол билан даволаганда ҳам деярли шунга ўхшаш натижаларни

олдик. Даволаниш олиб борилмаган гурухга солишириганды бу гурухда олиб борилган терапия натижасида сиал кислоталари миқдори 87,8% га, фукоза миқдори 94,9% га, умумий оқсил миқдори 40,7% га ошди. Сукралфат билан даволанган гурух ҳайвонларыда сиал кислоталари, фукоза миқдорининг бироз катталашиши, умумий оқсил миқдори камайишини кузатдик, лекин бу натижалар даволанмаган гурух

натижаларидан ишонарсиз фарқ қилди. Пепсан-Р билан даволашда препаратнинг стимулловчи самарасини кузатдик. Бу гурухда сиал кислотаси миқдори 50,6% га, фукоза миқдори 79,8% га ва умумий оқсил миқдори 30,5% га кўпайди.

**Хуносалар.** Шундай қилиб, ИГни даволашда шиллик тўсиқ синтезини омепразол камайтиради, рабепразол, де-нол ва пепсан-Р стимуллайди, сукралфат эса синтезга таъсир қилмайди.

## ИНФАРКТ МИОКАРДА 2 ТИПА АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ВО ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЕ

РЕЗНИК Е.В.<sup>1</sup>, ГОЛУБЕВ Ю.Ю.<sup>1</sup>, ЮРТАЕВА Н.В.<sup>2</sup>

<sup>1</sup>ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия, <sup>2</sup>Федеральное государственное казенное учреждение «Центральная поликлиника», Москва, Россия

В соответствии с 4-м универсальным определением, инфаркт миокарда (ИМ) – это острое повреждение миокарда в условиях доказанной клинически и/или электрокардиографически (ЭКГ) острой ишемии миокарда. О повреждении миокарда свидетельствует повышение в крови кардиального тропонина I или T выше 99-го процентиля от верхней границы нормы. Клинические проявления острой ишемии миокарда – это боль или дискомфорт за грудиной, в левой половине грудной клетки, одышка, сердцебиения, тошнота, рвота, боль в животе. ЭКГ-признаками острой ишемии миокарда является наличие в двух смежных отведениях: 1) новой элевации сегмента ST, 2) новой депрессии сегмента ST, 3) инверсий зубца T > 1 мм.

Для ИМ 2 типа (ИМ2) характерно наличие дисбаланса между поступлением и/или потреблением кислородом, что приводит к повреждению миокарда. Причины ИМ2: поражение коронарных артерий (КА) (атеросклеротическое сужение со стабильной бляшкой, спазм, эмболия, диссекция, дисфункция эндотелия и гладких мышц, симпатическая дисрегуляция), тяжелая гипоксия (анемия, дыхательная/сердечная недостаточность), нарушения кровообращения (шок, гипотония), нарушения ритма в виде тахиаритмии в течение > 20 мин или брадиаритмии, гипертонический криз, периоперационный период и др.

ИМ2 является вторичным по отношению к вышеописанным состояниям. Частота его варьирует от <2 до >70% всех ИМ. Наиболее часто встречается у женщин (46%), пожилых, тяжелых и коморбидных пациентов. В клинической картине боль – не характерный признак, чаще встречается одышка. На ЭКГ у 3–24% пациентов регистрируется элевация сегмента ST. Если повреждение миокарда небольшое, то элевации ST может не быть. Диагностика основана на выявлении повреждения миокарда, при этом клинических и ЭКГ признаков

острой ишемии миокарда может не быть. В отличие ИМ 1 типа при ИМ2 отсутствует тромб в КА во время ангиографии, внутрисосудистого ультразвукового исследования или аутопсии.

Особая форма ИМ–2 типа – перипроцедурный (периоперационный) ИМ, который представляет собой грозное осложнение больших некардиальных операций. Из-за анестезии клиническая картина стертая или бессимптомная. При этом лабораторное значение тропонина перед операцией и увеличение его в интра- и постоперационном периодах связано с развитием ИМ2. По статистике, в послеоперационном периоде у 35% пациентов повышается уровень тропонина, у 17% отмечается изменение его значений в динамике, что свидетельствует о развитии острого повреждения миокарда. Патогенез периоперационного ИМ до конца не ясен. Известно, что в периоперационном периоде повышается метаболическая активность организма, что приводит к увеличению потребности миокарда в кислороде и может вызывать ишемию и некроз кардиомиоцитов.

Другой вариант – ИМ без обструкции КА (MINOCA). На него приходится 6–8% от всех ИМ, встречается у женщин и у пациентов, поступающих с ИМ без подъема ST, реже у мужчин и пациентов с ИМ с подъемом ST. MINOCA может быть результатом коронарного спазма или спонтанной диссекции КА, что может встречаться при ИМ 1 и ИМ 2 типов.

**Выводы:** ИМ 2-го типа часто встречается в клинической практике, но диагностика ИМ 2-го типа затруднительна. Ведение пациентов с ИМ 2-го типа проблематично из-за недостаточной доказательной базы. Лечение должно быть персонализированным и включать подходы, уменьшающие потребность миокарда в кислороде и повышающие его доставку.

ПРИМЕНЕНИЕ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ ПРЕДИКТОРОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ ЛЕГЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 Рахимова Д.А., Аляви Б.А., Сабиржанова З.Т.....	111
ОЦЕНКА КОМОРБИДНОСТИ И ДИСФУНКЦИИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ С УЧЕТОМ ГЕНДЕРНОЙ ОСОБЕННОСТИ Рахимова М.Э., Гадаев А.Г., Туракулов Р.И.....	111
ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ И ДИСФУНКЦИЕЙ ПОЧЕК Рахимова М.Э., Юлбарисов А.А., Очилов И.....	112
ПРЕНАТАЛЬНЫЙ ЭСТРОГЕННО-ТЕСТОСТЕРОНОВЫЙ БАЛАНС КАК ФАКТОР РИСКА АБУЗУСНОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ У ВЗРОСЛЫХ Рахимова Ш.М., Сайдвалиев Ф.С., Рахимова Г.М.....	113
ИНДОМЕТАЦИНЛИ ГАСТРОПАТИЯДА МЕДДАНИНГ ШИЛЛИҚ ТҮСИФИ ҲОЛАТИГА ПРОТОН ПОМПА ИНГИБИТОРЛАРИ, ЦИТОПРОТЕКТОРЛАР ВА УЛАРНИНГ КОМБИНАЦИЯЛАРИ ТАЪСИРИНИ ЎРГАНИШ Рахматуллаева Г.К., Якубов А.В., Хамраев А.А.....	113
ИНФАРКТ МИОКАРДА 2 ТИПА АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ВО ВНУТРЕННЕЙ МЕДИЦИНЕ Резник Е.В. <sup>1</sup> , Голубев Ю.Ю <sup>1</sup> , Юртаева Н.В.2.....	114
ОСТЕОАРТРИТ БИЛАН КАСАЛЛАНГАН БЕМОРЛАРДА РЕАБИЛИТАЦИЯ ДАСТУРЛАРИ САМАРАДОРЛИГИ Сафаров А.Ж., Камилова У.К.....	115
БЕЗОПАСНОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19 ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ Сенгыrbай Ж.У., Косanova А.К., Бейсембай Ж.К., Мырзатай А.Б., Жылкыбай Ж.О., Оразалы Е.Б., Султанова С.Ж., Оспан А.Б., Сабырбаева Г.А.....	115
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ЭПИДЕМИЙ НА ПРИМЕРЕ COVID-19 В КАЗАХСТАНЕ Серовайский С., Турар О., Азимов А., Мустафин М.....	116
СОСТОЯНИЕ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ В Собирова Г.Н., Каримов М.М., Зуфаров П.С., Каримова Д.К.....	117
COVID-19 БИЛАН КАСАЛЛАНГАНЛАРДА МЕДИКАМЕНТОЗ РЕАБИЛИТАЦИЯДАН КЕЙИНГИ ЦИТОЛИТИК КҮРСАТКИЧЛАР ДИНАМИКАСИ Собирова Г.Н., Бафоева З.О.....	118
ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ COVID-19 НА ПРОФИЛЬ ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ БОЛЬНЫХ С СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ Сугралиев А.Б., Ижанова А.К., Ерниязова А.Н., Ерланқызы А., Алмазқызы А., Әбду А.Ж., Нұрбақытқызы М.....	118
ОСТРЫЙ КОРОНАРНЫЙ СИНДРОМ ЭПИДЕМИОЛОГИЯ, РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ Сулейменов А.К., Байдүйсен С., Куанышбаева З.Т., Саламбекова Г.Ш.....	119
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ТКАНЕЙ ДЫХАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ЖИРОВОЙ ЭМБОЛИИ Султанов С.Б., Бахриев И.И., Султанова С.М.....	120
КОМОРБИДНОСТЬ И РАЗВИТИЕ МАСЕ В ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКОМ РЕГИОНЕ Сурунович Ю.Н., Подпалов В.П., Журова О.Н.....	121
ДОСТИЖЕНИЕ ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ К ВЫПОЛНЕНИЮ ВРАЧЕБНЫХ НАЗНАЧЕНИЙ Талипов Р.М., Нурметов Х.Т., Худайберганова Н.Х.....	121
КОРОНАВИРУС АССОЦИРЛАНГАН НЕФРОПАТИЯЛЯРНИНГ КЛИНИК-ПАТОГЕНЕТИК ЖИҲАТЛАРИ Ташпулатова М.Х., Собиров М.О.....	122
ЛУЧЕВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЛЕГКИХ ПЕРЕНЕСЕННОЕ ПНЕВМОНИИ КОРОНАВИРУСНОЙ ЭТИОЛОГИИ Тешаев О.Р., Рахмонова Г.Э.....	122
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ОБСТРУКТИВНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ Тешаев О.Р., Рахмонова Г.Э., Уктамова Д.З.....	123
ВНЕЗАПНАЯ СЕРДЕЧНАЯ СМЕРТЬ НА ОСНОВЕ СЕМЕЙНОГО И ОБРАЗОВАТЕЛНОГО СТАТУСА (ПОПУЛЯЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ В ПРИМЕРЕ РЕГИОНОВ УЗБЕКИСТАНА) Туйчиев А.Х., Мамасалиев Н.С., Курбанова Р.Р.....	123
К ВОПРОСУ РЕАБИЛИТАЦИИ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У БОЛЬНЫХ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19 Туляганова Ф.М.....	124
АНАЛИЗ ДЕТСКОЙ СМЕРТНОСТИ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ СЕРДЦА ПО ДАННЫМ АУТОПСИЙ Турсунов Х.З., Конычев Д.В.....	124
ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ СОДЕРЖАНИЯ ВИТАМИНА Д В КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ Урунбаева Д.А., Нажмутдинова Д.А., Кадирова Н.....	125
БҮЙРАК ТРАНСПЛАНТАЦИЯСИНИ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ҲАЁТ СИФАТИ КҮРСАТКИЧЛАРИГА ИЖТИМОЙ-ИҚТISODИЙ ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ Усманова Д.У., Даминов Б.Т., Ибрагимов А.Ю., Алимов У.С.....	126
СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ НА ЖИЗНЕУГРОЖАЮЩИЕ ГИПЕРТОНИЧЕСКИЕ КРИЗЫ (ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ) Усмонов Б.У., Мамасалиев Н.С., Курбанова Р.Р.....	126
ФАКТОРЫ РИСКА УХУДШЕНИЯ ФУНКЦИИ ПОЧЕК У БОЛЬНЫХ ПОДАГРОЙ Фолатова А.А., Кушаков Д., Набиева Д.А.....	127
НЕКОНТРОЛИРУЕМАЯ БРОНХИАЛЬНАЯ АСТМА В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРОВ ЭКСТРЕННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ: КЛИНИКО-МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ПЕРИОДЫ БОДРСТВОВАНИЯ И СНА Халикова Н.А., Мамасалиев Н.С., Усманов Б.У.....	128