



TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASIGA 100 YIL



TOSHKENT TIBBIYOT
AKADEMIYASIGA 100
YIL

Toshkent tibbiyot akademiyasi tashkil etilganining
100 yilligiga bag'ishlangan

**“Toshkent tibbiyot akademiyasiga 100 yil – buyuk ishlar va yangi
kashfiyotlar davri”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami

Сборник материалов научно-практической конференции с международным
участием, посвященной 100-летию Ташкентской медицинской академии,
**«100 лет Ташкентской медицинской академии – эпоха больших
свершений и открытий»**

Collection of materials of the scientific and practical conference with
international participation, dedicated to the 100th anniversary of the Tashkent
Medical Academy,

**"100 years of the Tashkent Medical Academy – the era of great
achievements and discoveries"**



Сборник материалов научно-практической конференции с международным участием, посвященной 100-летию Ташкентской медицинской академии,
«100 лет Ташкентской медицинской академии – эпоха больших свершений и открытий»

2022 год
г. Ташкент, Узбекистан

Toshkent tibbiyot akademiyasi tashkil etilganining 100 yilligiga bag'ishlangan

“Toshkent tibbiyot akademiyasiga 100 yil – buyuk ishlar va yangi kashfiyotlar davri” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami

2022 yil
Toshkent sh., O'zbekiston

Collection of materials of the scientific and practical conference with international participation, dedicated to the 100th anniversary of the Tashkent Medical Academy,

"100 years of the Tashkent Medical Academy – the era of great achievements and discoveries"

2022
Tashkent, Uzbekistan

ЧАСТОТА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 1 ТИПА

Петрова М. А., Макарова Т. П., Мельникова Ю.С.

Казанский государственный медицинский университет, Российская Федерация

Актуальность. Сахарный диабет является одной из самой распространенной патологией в эндокринологии, и цифры больных с каждым годом растут. При этом знание о частоте развития такого осложнения как диабетическая болезнь почек актуально в практике врача для ранней диагностики и лечения, так как высок риск инвалидизации больных, что определяет социальную и медицинскую значимость.

Цель исследования. Определить частоту и характер поражения почек у детей с диагнозом сахарный диабет по данным эндокринологического отделения ГАУЗ ДРКБ МЗ РТ.

Материалы и методы исследования. Нами был проведен ретроспективный анализ историй болезней пациентов ДРКБ за 5 лет. Всего было проанализировано 450 историй болезней 160 пациентов. Использовались следующие методы исследования: общеклинические (общий анализ мочи, общий анализ крови), биохимические анализы, инструментальные методы исследования, скорость клубочковой фильтрации почек определяли по формуле Шварца.

Результаты исследования. Возраст пациентов: 8-11 лет 16 детей (10%), 12-13 лет 38 детей (30%), 14-18 лет 96 детей (60%), из них девочек 120 (75%), мальчиков 40 (25%). У 48 детей (30%) наблюдались изменения в ОАМ в зависимости от стажа заболевания: изменения в анализах мочи наблюдалось у детей со стажем до 1 года у 3 (6,25%) детей, со стажем 1-5 лет у 28 (58,33%), 5-10 лет – у 13 (27,08%), свыше 10 лет – у 4 (8,34%). Не наблюдалось изменений со стороны анализов у 112 (70%) пациентов. Средний уровень протеинурии составлял у детей со стажем заболевания менее 1 года 0,5 г/л, 1-5 лет – 1,2 г/л, 5-10 лет – 1,98 г/л, свыше 10 лет – 3,1 г/л. СКФ у детей со стажем заболевания менее 1 года составил 158 мл/мин/1,73м², 1-5 лет - 136 мл/мин/1,73м², 5-10 лет - 73 мл/мин/1,73м², свыше 10 лет – 29 мл/мин/1,73м².

Выводы. Выявлено, что поражение почек, сопровождающееся протеинурией, при сахарном диабете составляет 32,5% и является определяющим в прогнозе заболевания. Необходимо раннее выявление в доклинической стадии диабетической нефропатии для профилактики дальнейшего прогрессирования.

SIMPTOMATIK EPILEPSIYADAGI DEPRESSIV BUZILISHLARNING TIBBIY- PSIXOLOGIK KORREKSIYASI

Raimqulov A.I., Ishanxojayeva G.T., Maxamatjanova N.M.

Toshkent tibbiyot akademiyasi, O'zbekiston

Tadqiqot maqsadi: Simptomatik epilepsiyadagi depressiv buzilishlarni kognitiv-bixeviorial terapiyani qo'llash orqali samarali korreksiya qilish.

Tadqiqot materiali va metodlari. Tadqiqot o'tkazish uchun 20 yoshdan 40 yoshgacha bo'lgan 40 nafar bemorlar tanlab olindi. Jinslar nisbatiga ko'ra 27 nafar erkaklar (67,5%), 13 nafar ayollar (32,5%). Bemorlarda klinik-laborator va barcha instrumental tekshiruvlar o'tkazildi. Bemorlarning depressiya ko'rsatkichlarini aniqlash uchun Gamilton testidan foydalanildi. Davolash samaradorligini aniqlash maqsadida bemorlar 2-guruhga bo'lib o'rganildi: 1)Asosiy guruh-20 nafar (50%) standart basis davo va kognitiv bixeviorial terapiya qo'llanilgan bemorlar; 2)Nazorat guruhida esa 20 nafar (50%) standart basis davo o'tkazilgan bemorlar. Psixoterapiya maqsadida asosiy guruhda 3 kun oraliq bilan 5 marta kognitiv-bixeviorial terapiya o'tkazildi.

Natijalar: Bemorlarda olib borilgan tekshiruv natijalariga ko'ra asosiy guruhdagi 1 (5%) nafar bemorda o'ta og'ir, 6(30%) nafarida og'ir, 11 (55%) nafarida o'rta va 2 (10%) nafarida yengil darajadagi depressiya qayd etildi. Nazorat guruhida esa 2 nafar (10%) bemorlarda o'ta og'ir, 6 (30%) nafarida og'ir, 9 (45%) nafarida o'rta va 3 (15%) nafarida yengil darajali depressiya

aniqlandi. Qo'llanilgan davodan keyin bemorlardagi depressiya darajasi qayta tekshirilganda asosiy guruhdagi 20 nafar bemorning 12 (60%) nafarida depressiya aniqlanmadi, 5 (25%) nafarida yengil va 3(15%) nafarida o'rta darajadagi depressiya qayt etildi. Nazorat guruhidagi bemorlarning 9 (35%) nafarida yengil, 7 (25%) nafarida o'rta va 1 (5%) nafarida og'ir darajadagi depressiya qayd etildi va 3(35%) bemorda depressiya umuman aniqlanmadi.

Xulosa: Tadqiqot natijalariga ko'ra simptomatik epilepsiyadagi depressiv buzilishlarni erta aniqlab, ularni korreksiya qilishda kognitiv-bixevioral terapiya usulini qo'llash bemorlar psixoemotsional holatining yaxshilanishiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir qilishi aniqlandi.

ZAMONAVIY SINTETIK PSIXOAKTIV MODDALARNI SUISTE`MOL QILISH BILAN BOG`LIQ PSIXOTIK BUZILISHLAR

Rajabov M.N., Turdiev A.A., Yadgarova N.F., Pulatov M.S.

Toshkent tibbiyot akademiyasi, O'zbekiston

Tadqiqotning dolzarbligi: So'nggi yillarda turli xil sintetik psixoaktiv moddalarni suiste`mol qilish xolatlari ortib bormoqdi, o'z o'rnida ularni alohida yoki birgalikda iste`mol qilish natijasida psixotik darajadagi ruhiy buzilishlar ortib bormoqdi.

Tadqiqot materiallari: 2020 yilda Toshkent shahar ruhiy kasalliklar shifoxonasida giyohvand moddalarni suiiste`mol qilish fonida 72 bemor gospitalizatsiya qilindi, ulardan 62,5% ni sintetik psixoaktiv vositalarni iste`mol qilganlar tashkil qildi. Ijtimoiy jihatdan bu bemorlarning asosiy qismi yoshlar bo`lib, oila qurmagan, ma`lumoti o'rta yoki o'rta maxsus, mehnat qobiliyati saqlangan, ammo ayni vaqtda ishsiz yoki ish staji kichik bo`lganlar. Qabul qilingan bemorlarning taxminan 50% ining anamnezida geroin yoki nasha chekishi aniqlangan. Psixofaol moddalarni iste`mol qilish turiga qarab, bemorlarni 3 asosiy guruhga bo`lish mumkin. 1-guruh: chekishga mo`ljallangan aralashmalarni iste`mol qilganlar; 2-guruh: "tuzlarni" suiste`mol qiluvchilar; 3-guruh: turli psixofaol moddalarni birgalikda, aralash qo`llagan bemorlar.

Tadqiqot natijalari: Psixozning rivojlanishidan oldin uzoq vaqt (kamida 2 haftagacha) PAMlarni iste`mol qilish kuzatilgan. Kasallikning klinik manzarasida opioidlar, alkogol va boshqa PAM xos abstinentsiya alomatlari kuzatilmagan. Shuningdek yaqqol vegetativ, metabolik va suv - elektrolitlar balansining buzilishi ham kuzatilmagan. Psixozning psixopatologik tuzilishida gallyutsinatsiyalar (62%), illyuziyalar (17%) va ta`qib, jismoniy ta`sir vasvasalari (71%) yaqqol dominantlik qilgan. Bemorlar qo`rquv bilan ularni maxsus xizmat xodimlar tomonidan kuzatilayotganini, ularni ta`qib qilishayotganliklarini ta`kidlab, o`zini himoya qilishga harakat qilishgan, to`siqlar qurishgan, kuzatuv asboblarini qidirish, yoki qattiq tajovuzkor xatti-harakatlarni amalga oshirishgan. Qo`pol xatti-harakatlar buzilishi psixiatrik tez yordam chaqirishning asosiy sababi bo`lgan. Psixotik simptomlarni bartaraf etgandan so`ng, bemorlarning ko`pchiligida uzoq vaqt rezidual vasvasa saqlanib turgan (1 oygacha). Postabstinent davrda psixopatologik buzilishlardan, qoida tariqasida, psixopatik reaksiyalar, disforiya (63%), uyqu buzilishi (65%) kabilar kuzatilgan. Psixozni davolash uchun asosan somatotropik va psixofarmakologik terapiyaning kombinatsiyasi qo`llanilgan. Gallyutsinator-vasvasali buzilishlarni bartaraf etish uchun galoperidolni mushak ichiga kuniga kamida 10 mg dozada qo`llanilgan. Psixotik xavotirni bartaraf etish va uyquni meyorlashtirish uchun benzodiazepin preparatlari (diazepam, fenazepam) qo`llanildi. Postpsixotik davrda affektiv va xulq-atvor buzilishlarni bartaraf etishda psixofarmakologik tadbirlar muhim ahamiyatga ega.

Xulosa. Shu bilan birga, SIOZS guruhiga kiruvchi antidepressantlar, antikonvul'santlar va nootropalar qo`llanilishi maqsadga muvofiq bo`ladi.

COVID - 19 BILAN BOG`LIQ STRESSGA QARSHI TADBIRLAR DOIRASIDA REABILITATSIYA TIZIMIDA QISQA MUDDATLI PSIXOTERAPIYA QO`LLANISHI

Rajabov M.N., Ashurov Z.Sh. , Yadgarova N.F., Poyanov O`

Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent

REVMATOID ARTRITLI BEMORLARDA JIGAR FUNKSIONAL HOLATINING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	101
Jamolov A.Sh., Kasimova M.B.	101
NOSPETSIFIK YARALI KOLITLI BEMORLAR XUSUSIYATLARI	102
Karimov M.M., Zufarov P.S., Yakubov A.V., Pulatova N.I.....	102
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЫ У ДЕТЕЙ	102
Каримова Н.И.....	102
KORONOVIRUSLI ZOTILJAM BILAN XASTALANGAN BEMORLARNI DAVOLASHDA ANTIBAKTERIAL DAVODA MAHALLIY REVMOFLOKS NEO VA HORIIY LEVOFLOKS-NLNING FARMAKOEKONOMIK TAXLILI.....	103
Komolova F.Dj., Akbarova D.S., Abdumadjidova N.X., Abdusamatova D.Z., Sabirov A.....	103
ҚЎЛ ТУННЕЛ СИНДРОМЛАРИНИ КОМПЛЕКС УСУЛДА ДАВОЛАШ.....	104
Мадаминов Д.Э., Нуримов Ф.Қ., Непесов А.Я.....	104
THE RESEARCH OF CLINICAL AND FUNCTIONAL FEATURES OF MYOCARDIAL INFARCTION IN POSTMENOPAUSAL WOMEN.....	105
Makhkamova M.M., Nurillaeva N.M.	105
THE RESEARCH OF THE MAIN PSYCHOSOCIAL PREDICTORS OF MYOCARDIAL INFARCTION IN YOUNG PEOPLE	106
Makhkamova M.M., Ganiev J.I.....	106
ИМУННЫЙ МИКРОТРОМБОВАСКУЛИТ: ОСОБЕННОСТИ ВСТРЕЧАЕМОСТИ И КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ	107
Маткаримова Д.С., Фахриддинова Н.	107
ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР КАСАЛЛИКЛАРДА БУЛЬБАР ВА ПСЕВДОБУЛЬБАР СИНДРОМЛАРДАГИ НЕВРОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАР	107
Мухаммаджонова М.Д., Шермухамедова Ф.К., Абдуллазизова У.С., Кирбоев Ж.Т., Умаров Ж.М.	107
EXPERIENCE OF USING UPERIO IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE	108
Musaeva L.J., Akbarova D.S., Pulatova D.B., Pulatova N.I., Abdusamatova D.Z., Islomova M.Sh.	108
О‘TKIR ISHEMIK INSULT BILAN KASALLANGAN BEMORLARDA “KALGEN” PREPARATINI DAVOLASH JADALLIGIGA TA’SIRINI O’RGANISH.....	109
Nabiyev N.I., Atashev A.R.....	109
ВЕНТИЛЯТОР-АССОЦИИРОВАННЫЕ ПНЕВМОНИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ И МЛАДЕНЦЕВ: ВОПРОСЫ ЭТИОСТРУКТУРЫ И АНТИБИОТИКОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ	110
Насирдинов Ф.Р., Боконбаева С.Дж.	110
ЧАСТОТА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК У ДЕТЕЙ.....	111
Петрова М. А., Макарова Т. П., Мельникова Ю.С.	111
SIMPTOMATIK EPILEPSIYADAGI DEPRESSIV BUZILISHLARNING TIBBIY-PSIXOLOGIK KORREKSIYASI.....	111
Raimqulov A.I., Ishanxojayeva G.T., Maxamatjanova N.M.....	111