

МЕЬДА ОСТИ БЕЗИ САРАТОНИНИНГ СҮНГГИ БОСҚИЧЛАРИДА ДАВО УСУЛЛАРИ

Маллаев М.М., Абдусатторов Р.А., Шаробидинов Б.Б.

МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ РАКА ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ПОСЛЕДНИХ СТАДИЯХ

Маллаев М.М., Абдусатторов Р.А., Шаробидинов Б.Б.

METHODS OF TREATMENT FOR PANCREATIC CANCER IN LAST STAGES

Mallaev M.M., Abdusattorov R.A., Sharobidinov B.B.

Тошкент тиббиёт академияси

Обзоры

Рак поджелудочной железы считается одним из агрессивных раков, но из-за отсутствия специфических симптомов большинство пациентов обращаются на местно-распространённых стадиях или с метастатическим поражением. Это приводит к затруднению выбора метода лечения и ухудшению результатов лечебных вмешательств. Проводимые лечебные мероприятия улучшают результаты лечения, но прогноз болезни остается неблагоприятным. В настоящее время из-за низкой эффективности традиционного лечения необходима разработка новых методов и внедрение их в практику.

Ключевые слова: рак поджелудочной железы, химиотерапия, метастазы, таргетная терапия, иммунотерапия.

Pancreatic cancer is considered one of the aggressive cancers, but because of the absence of specific symptoms, most patients are treated in locally advanced stages or with metastatic lesions. This leads to difficulties in choosing a method of treatment and worsening the results of treatment interventions. Conducted treatment measures improve the results of treatment, but the disease prognosis remains unfavorable. Currently, due to the low inefficiency of traditional treatment, it is necessary to develop new methods and introduce them into practice.

Key words: pancreatic cancer, chemotherapy, metastases, targeted therapy, immunotherapy.

Меъда ости бези саратонини (МОБС) даволаш такти-
кинин танлаш ва даволаш натижалари касаллик-
нинг босқичига боғлиқ. Меъда ости бези саратонини эрта
босқичларида жарроҳлик аралашуви радикал даво усули
ҳисобланади. Аммо бирламчи ташхис кўйилган 15-20% бе-
морлардагина жарроҳлик амалиёти ўтказиш имконияти
бўлади [7,21]. Эпидемиологик жиҳатдан ўлим кўрсаткичи
бўйича меъда ости бези саратони тўртинчи ўринда турди
ва ҳозирги кунда мавжуд даво усуллари билан беморлар-
нинг умумий яшовчанлигини ўртacha 1 йилгача ўзгартириш
имконияти мавжуд [21]. Жарроҳлик усули кўллаб бўлади-
ган ҳолларда эса беморларнинг 5-йиллик умумий яшовчан-
лиги ўртacha 20% ни ташкил қиласди [6,27].

Юқорида келтирилган натижалар меъда ости бези саратонини даволаш чораларини такомиллаштириш эҳтиёжини юзага келтиради. Бунда нафакат янги даво чораларини излаш ва меъда ости безидаги онкогенез жараёнини чукурроқ тушуниш, балки рак олиб касалларини диагностикаси ва даво-
сини ўз вақтида олиб бориш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Шу билан бирга, ҳозирги кунда меъда ости бези саратони ва бошқа онкологик жараёнларни даволашда йўл қўйилаётган хатоли-
кларни ва онкологик касалларнинг механизмларини ту-
шунишда етишмаётган қирраларни кашф қилиш ҳал қилувчи
аҳамият касб этади. Шунинг учун ушбу мақоламиизда мавжуд
даво усуллари ва уларнинг натижалари билан биргалиқда
камчиликлар ва келажақда амалга оширилиши мумкин бўл-
ган терапевтик ёндашувлар устида сўз юритамиз.

Бу даво чоралари ўз вақтида жуда катта муваффақи-
ят ва катта ишонч билан кутиб олинган бўлсада, ҳозирги
кунда уларга нисбатан рак ҳужайраларида чидамлилик-
нинг ривожланиши ёки рак ҳужайраларида препаратор-
га қарши табиий чидамлиликнинг бўлиши анъанавий
даво препараторини кўллаш самарадорлигини пасайи-
шига сабаб бўлмоқда [25]. Бундан ташқари уларда танлаб
таъсир этиш ҳусусияти ўйқлиги туфайли рак ҳужайралари
билан биргаликда организм нормал тўқима ҳужайралари-
ни ҳам нобуд бўлишига олиб келади. Натижада беморлар-
нинг аксарияти онкологик жараённинг ўзидан эмас балки
даво чоралари натижасида юзага келадиган асоратлардан
кўпроқ азият чекишиади. Яна шуниси эътиборга моликки,

аксарият ҳолларда монотерапия билан даволаш кутилган
натижани бермайди ва поликимёттерапия ёки комбинир-
лашган даво ўтказиш кўп касалларларда стандарт чора-
сифатида қабул қилинган [6].

**Метастатик меъда ости бези саратони: биринчи қа-
тор даво чоралари**

1950-йиллардан норезектабел ва метастатик меъда
ости бези саратонини даволашда энг асосий препарат сифа-
тида 5-Фторурацил (5-ФУ) ишлатиб келинган, аммо моноте-
рапияда умумий яшовчанлик б 6 ойдан ошмаган [19,6]. 5-ФУни
бошқа дори препаратлари билан, жумладан, доксорубицин,
циклофосфамид, винクリстин, цисплатин билан кўллаш ҳам
даволаш натижалариниң аҳамиятли даражада ўзгартирма-
ган [19,20]. Кейинчалик 5-ФУ ўрнига гемцитабиннинг кўлла-
нилиши беморларнинг умумий яшовчанлигини 4.41 ойдан
5.65 ойгача ошириди, шу билан бирга 1 йиллик яшовчанлик
гемцитабин олган беморларда 18% ни ташкил қиласган бўлса,
5-ФУ гуруҳида эса 2% ни ташкил қиласди [16,17].

Гемцитабин монотерапия сифатида 5-ФУ нинг ўрни-
ни олгандан сўнг уни бошқа препаратлар билан биргалик-
да кўллашга ва даво самарадорлигини оширишга қизиқиши
ошди. Шундай текширувлардан бири гемцитабинни моно-
терапия сифатида ва капецитабин билан биргаликда кўл-
лаш самарадорлигини синааб кўриш бўлди. Бунда кутилгани-
дек комбинирлашган даво самарадорлиги монотерапиядан
устун чиқди. Беморларнинг умумий яшовчанлиги 6.1 ойдан
7.1 ойгача ошди. Шу билан бирга жисмоний кўрсаткичлари
юқори беморларда умумий яшовчанлик (УЯ) бундан ҳам
юқори бўлиб, 10.1 ойни ташкил қиласди, монотерапияда эса
7.4 ойни. Юқоридаги натижаларни ҳисобга олиб гемцитабин
ва капецитабин комбинацияси метастатик МОБС нинг
стандарт даво чораси сифатида тан олинди [24].

Гемцитабинни платина ҳосилалари билан бирга кўл-
лаш дастлабки текширувларда етарли даражада самара-
дорликка эга бўлмаган комбинация деб топилган (УЯ мо-
нотерапия ва комбинацияда мос равища 7.2 ва 8.3 ойни
ташкил қиласган) [18]. Аммо 623 та беморни қамраб олган
5 та рандомирлашган текширувларни метаанализ қилин-
гандага гемцитабин ва цисплатин комбинацияси маълум
гуруҳ беморларида аҳамиятли даражада юқори яшовчан-

ликни бериши аниқланди [14]. Бу гурӯҳ беморларда меъда ости бези саратони келиб чиқишида ирсий омилнинг ўрни мавжуд бўлиб, рак ҳужайраларида BRCA гени мутацияга учраган бўлади. Бу геннинг оқсили ДНКда юзага келган мутацияларни гомологик рекомбинация ёрдамида тиклаш вазифасини бажаради, яъни бир хромосомада юзага келган кўпол бузилишларни иккинчи шу хромосомага гомолог бўлган жуфт хромосома ДНКси ёрдамида тиклаши имконини беради. Бу ҳужайраларнинг яшовчанлигини оширади, мутацион омилларга чидамлиги ошади [8]. Цисплатин алкилловчи восита сифатида ДНКга боғланиб, занжирлари орасида боғлар ҳосил қиласи ва репликацияга тўқсинглик қиласи. BRCA мутациясига эга ҳужайралар цисплатиннинг таъсиридан чиқа олмайди ва нобуд бўлади. Шунинг учун оиласи анамнезида эрта ёшда кўкрак бези саратони, тухумдан саратони бўлган беморларда бу схема яхши натижа берган (УЯ медианаси 22.9 ой BRCA-да ва 6.3 ой BRCA+да) [1]. BRCA гени мутация мавжудлиги даволаш самарадорлигини янада ошириш имконини берди, яъни PARP (poly (ADP-ribose) polymerase) ингибиторлари билан ўсма ҳужайраларидаги ДНК тиклаши хусусиятига икки томонлама таъсир этиши имкони пайдо бўлди. Кичик текширувларда УЯ медианасини 27.6 ойга узайтиришга эришилди. Гемцитабинга оксалиплатин, иринотекан ёки пеметрексид кўшиш клиник самара бермаган [1,11].

2011 йилда, Copey va б.лар ўтказган клиник синовда комбинацион даво (FOLFIRINOX: 5-ФУ, леуковорин, иринотекан, оксалиплатин) гемцитабин монотерапиясидан аҳамиятли даражада юқори натижа берди. FOLFIRINOX гуруҳида УЯ медианаси 11.1 ойни, гемцитабин монотерапия гуруҳида эса 6.8 ойни ташкил қиласи [3]. Шунинг учун ҳозирги кунда яхши жисмоний кўрсаткичга эга, метастатик ёки маҳаллий тарқоқ МОБСда FOLFIRINOX комбинацияси стандарт даво бўлиб қолмоқда. Бундан ташқари гемцитабин билан nab-Паклитаксел кўллаш ҳам гемцитабин монотерапиясига нисбатан яхши натижа берган (УЯ медианаси 8.5 ой ва 6.7 ой мос равишида) [26]. EGFR 90% ҳолларда мусбат чиқади, аммо таргет препарати сифати эпидермал ўсиш омили рецепторига қарши препарат эрлотиниб ва цетуксимаб кўлланилганда УЯ медианаси 6.24 ойни ташкил этган ҳолос [15]. Шунинг учун ҳозирги кунда nab-паклитаксел+гемцитабин ва FOLFIRINOX норектабел МОБС учун биринчи қатор даво чораси бўлиб қолмоқда.

Метастатик меъда ости бези саратони: иккинчи қатор даво чоралари

Гемцитабин комбинацияларига чидамлилик ривожланган МОБСда 5-ФУ комбинациялари кўллаш тавсия этилади. Кўпчилик шифокорлар FOLFOX схемасини кўллашни афзал кўради. Биринчи даво чораси FOLFIRINOX бўлган беморларда чидамлилик ривожланган ҳолларда эса иккинчи қатор даво чораси сифатида гемцитабинли комбинациялар қўлланилади. Лекин шуни ҳисобга олиш керак, МОБСда иккинчи қатор препаратларини танлашда ягона умумий келишув ёки ишлаб чиқилган стандарт йўқ. Препаратлар танлови эса кўпроқ беморнинг аҳволига боғлиқ. Турли комбинацияларни кўллаш бўйича тадқиқотлар натижалари эса кўп ҳолларда бир бирига қарши натижалар билан якунланган [4,28]. Иккинчи қатор препаратларни кўллаганда ҳам самара қузатилмаган беморлар учун стандарт даво чоралари ишлаб чиқилмаган.

Меъда ости бези саратони ривожланишининг молекуляр механизмларини ўрганиш янги терапевтик нишонларни аниқлаш имконини берди. Бу механизmlар орасида ҳужайралар пролиферациясини, яшовчанлигини оширувчи протоонкогенлар ва уларга қарши оқсиllардаги ўзгаришлар асосий ўрин эгаллайди. Геном текширувлари

дан маълум бўлди, ҳужайра циклини бошқарувчи KRAS, p16 оқсиllари; апоптоз ва ДНК заарланишини сезувчи p53 ва p14;SMAD оқсили; эмбрионал ривожланишини бошқарувчи Hedgehog, Notch, Wnt ва NF-kB лар карциногенезни ҳаракатлантирувчи омиллар ҳисобланади [5,1,13,22]. Карциногенезда биргина оқсиllинг мутацияси ёки юқори экспрессияси ҳаракатлантирувчи куч бўла олмайди, балки бу жараён трансформацияга учраётган ҳужайраларнинг микромухит компонентлари, иммунокомпетент ҳужайралар ва стромал ҳужайралар билан алоқасига ҳам боғлиқ. Шу билан бирга МОБСда строма ўзига ҳос зич бўлиб, бу дори препарлатларининг ўтишига ҳам тўсқинлик қиласи ва ўз навбатида ўсма ҳужайраларининг гетероген клонларининг пайдо бўлишига олиб келади [2]. Бундан маълум бўлди, биргина оқсилини нишон сифатида ишлатиш билан терапевтик самарага эришиб бўлмайди. Шундай бўлса-да ҳозирги кунда МОБСда мавжуд таргет даволари бўйича маълумот бериб ўтамиз ва уларнинг самарасини ошириш йўналишларининг таҳлилига қисқача тўхталамиз.

Эпидермал ўсиш омили рецептори (EGFR) 90% ҳолларда мусбат чиқсада ҳозирги кунга қадар ўтказилган клиник тадқиқотларда EGFR рецепторига қарши таргет препаратлари билан аҳамиятли самарага эришилган йўқ [15]. Ҳозирги кунда бошқа анти-EGFR препаратларининг, жумладан, афатиниб, нимотузумаб, тирозин киназа ингибитори эрлотиниб ва HER2 антагонистрастузумаб комбинацияларини кўллаш бўйича 2 фаза текширувлари кетмоқда [13]. МЕКоқсили ингибитори траметиниб [12], hedgehog сигнал йўли ингибитори висмедогиб, ангиогенез ингибитори бевасузимаб каби таргет препаратлари бўйича ўтказилган эрта клиник тадқиқотлар самарасиз натижа билан тугаган [12]. Чуқурроқ таҳлил қилиб кўрсак, саратон ҳужайралари яшовчанлигини ва препаратларга резистентлигини таъминлаш учун биргина сигнал йўлидан фойдаланмайди. Бунинг исботи сифатида Jones ва б.лар томонидан меъда ости бези саратонинида кузатиладиган барча генетик мутацияларни 12 та асосий ҳужайравий сигнал тизимига бирлаштиришни келтириш мумкин. Бу сигнал йўлларига қарши таргет препаратларини ишлаб чиқиш амалий жиҳатдан самараги бўлиши мумкин [10]. Бир сигнал йўли оқсилини ингибирлаш генетик бекарорлик туфайли бошқа сигнал йўлининг фаолланишига олиб келади. Бу ҳолатда таргет препарати ўз аҳамиятини йўқотади.

Онкология соҳасини иммунология билан интеграцияси натижасида янги иммунотерапия йўналиши пайдо бўлди. Натижада кўплаб ҳавфли неопластик жараёнлар самараги даволана бошланди. Масалан, ипилумумаб, ниволумаб каби препаратлар меланомани, ўпка саратонини даволашда муваффақият билан қўлланилиб келинмоқда [23]. МОБСда иммунотерапия воситалари (иммун назорат ингибиторлари – checkpoint inhibitors) монотерапия ёки комбинация тарзида қўлланилганда касаллик прогрессијасини секинлаштириши ва умумий яшовчанликни яхшилаши аниқланган. Лекин, бу препаратлар ҳозирги кунда меъда ости бези саратонининг стандарт даво чоралари қаторидан ўрин олганича йўқ [9].

Меъда ости бези саратони молекуляр патогенези муррабаблиги ва ўсма ҳужайраларининг генетик гетерогенлиги янги даво чораларини ишлаб чиқишига тўсқинлик қиласи. Ҳозирги кундаги геном текширувлари натижаларини чуқурроқ таҳлил қилиш ва биргина мутацион оқсилини эмас балки атипик ҳужайралардаги сигнал тизимларига қарши таргет препаратлар ишлаб чиқиш амалий самарага олиб келиши мумкин. Бунда, албатта, ўсма миқромухитига таъсир этувчи ноатипик ҳужайралар сигнал тизимлари ҳам ҳисобга олиниши ва иммун жавоб шаклланишига имконият яратиш катта аҳамият касб этади.

Адабиётлар

1. Adamska A, Domenichini A, Falasca M. Pancreatic Ductal Adenocarcinoma: Current and Evolving Therapies // Int. J. Mol. Sci. – 2017. – Vol. 18. – P. 1338.
2. Carr R.M., Fernandez-Zapico M.E. Pancreatic cancer microenvironment, to target or not to target? // EMBO Mol. Med. – 2016. – Vol. 8, №2. – P. 80-82.
3. Conroy Th, Desseigne F. et al. FOLFIRINOX versus Gemcitabine for Metastatic Pancreatic Cancer // New Engl. J. Med. – 2011. – Vol. 364. – P. 1817-1825.
4. Da Rocha Lino A., Abrahao C.M., Brandao R.M. et al. Role of gemcitabine as second-line therapy after progression on FOLFIRINOX in advanced pancreatic cancer: A retrospective analysis // J. Gastrointest. Oncol. – 2015. – Vol. 6. – P. 511-515.
5. Eser S, Schnieke A, Schneider G, Saur D. Oncogenic KRAS signalling in pancreatic cancer // Brit. J. Cancer. – 2014. – Vol. 111. – P. 817-822.
6. Hidalgo M., Cascino S. et al. Addressing the challenges of pancreatic cancer: future directions for improving outcomes // Pancreatology. – 2013. – Vol. 15. – P. 8-18.
7. Ilic M., Ilic I. Epidemiology of pancreatic cancer // Wld J. Gastroenterol. – 2016. – Vol. 22 (44). – P. 9694-9705.
8. Iqbal J., Ragone A., Lubinski J. et al. The incidence of pancreatic cancer in BRCA1 and BRCA2 mutation carriers // Brit. J. Cancer. – 2012. – Vol. 107, №12. – P. 2005-2009.
9. Johansson H., Andersson R. et al. Immune checkpoint therapy for pancreatic cancer // Wld J. Gastroenterol. – 2016. – Vol. 22 (43). – P. 9457-9476.
10. Jones S., Zhang X., Parsons D.W. et al. Core signaling pathways in human pancreatic cancers revealed by global genomic analyses // Science. – 2008. – Vol. 321. – P. 1801-1806.
11. Kaufman B., Shapira-Frommer R., Schmutzler R.K. et al. Olaparib monotherapy in patients with advanced cancer and germline BRCA1/2 mutation // J. Clin. Oncol. – 2015. – Vol. 33. – P. 244-250.
12. Lindberg J.M., Newhook T.E., Adair S.J. et al. Co-treatment with panitumumab and trastuzumab augments response to the MEK inhibitor trametinib in a patient-derived xenograft model of pancreatic cancer // Neoplasia. – 2014. – Vol.
13. Matsuoka T., Yashiro M. Molecular targets for the treatment of pancreatic cancer: Clinical and experimental studies // Wld J. Gastroenterol. – 2016. – Vol. 22 (№2). – P. 776-789.
14. McKenna S., Eatock M. The medical management of pancreatic cancer: A review // The Oncologist. – 2003. – Vol. 8. – P. 149-160.
15. Moore M.J., Goldstein D., Hamm J. et al. Erlotinib plus gemcitabine compared with gemcitabine alone in patients with advanced pancreatic cancer: a phase III trial of the National Cancer Institute of Canada Clinical Trials Group // J. Clin. Oncol. – 2007. – Vol. 25. – P. 1960-1966.
16. Neoptolemos J.P., Stocken D.D., Bassi C. et al. Adjuvant chemotherapy with fluorouracil plus folinic acid vs gemcitabine following pancreatic cancer resection: a randomized controlled trial // J.A.M.A. – 2010. – Vol. 304. – P. 1073-1081.
17. Oettle H., Neuhaus P., Hochhaus A. et al. Adjuvant chemotherapy with gemcitabine and long-term outcomes among patients with resected pancreatic cancer: the CONKO-001 randomized trial // J.A.M.A. – 2013. – Vol. 310. – P. 1473-1481.
18. Philip P.A., Zalupski M.M. et al. Phase II study of gemcitabine and cisplatin in the treatment of patients with advanced pancreatic carcinoma // Cancer. – 2001. – Vol. 92, №3. – P. 569-577.
19. Rossi M.L., Rehman A.A., Gondi C.S. Therapeutic options for the management of pancreatic cancer // Wld J. Gastroenterol. – 2014. – Vol. 20 (32). – P. 11142-11159.
20. Ryan D.P., Theodore S. Hong et al. Pancreatic cancer // New Engl. J. Med. – 2014. – 1039 p.
21. Siegel R., Naishadham D., Jemal A. Cancer statistics, 2013 // Cancer J. Clin. – 2013. – Vol. 63. – P. 11-30.
22. Teague A., Lim K.-H., Wang-Gillam A. Advanced pancreatic adenocarcinoma: a review of current treatment strategies and developing therapies // Ther. Adv. Med. Oncol. – 2015. – Vol. 7, №2. – P. 68-84.
23. Thallinger C., Füreder T., Preusser M. et al. Review of cancer treatment with immune checkpoint inhibitors: Current concepts, expectations, limitations and pitfalls // Wien. Klin. Wochenschr. – 2018. – Bd. 130, №3-4. – S. 85-91.
24. Ueno H., Ioka T., Ikeda M. et al. Randomized phase III study of gemcitabine plus S-1, S-1 alone, or gemcitabine alone in patients with locally advanced and metastatic pancreatic cancer in Japan and Taiwan: GEST study // J. Clin. Oncol. – 2013. – Vol. 31. – P. 1640-1648.
25. Vincent A., Herman J., Schulick R. et al. Pancreatic cancer // Lancet. – 2011. – Vol. 378. – P. 607-620.
26. Von Hoff D.D., Ervin T., Arena F.P. et al. Increased survival in pancreatic cancer with nab-paclitaxel plus gemcitabine // New Engl. J. Med. – 2013. – Vol. 369. – P. 1691-703.
27. Winter J.M., Brennan M.F., Tang L.H. et al. Survival after resection of pancreatic adenocarcinoma: results from a single institution over three decades // Ann. Surg. Oncol. – 2012. – Vol. 19. – P. 169-175.
28. Zaanan A., Trouilloyd I., Markoutsaki T. et al. FOLFOX as second-line chemotherapy in patients with pretreated metastatic pancreatic cancer from the FIRGEM study // BMC Cancer. – 2014. – Vol. 14. – P. 441.

МЕДА ОСТИ БЕЗИ САРАТОНИНИНГ СҮНГИ БОСҚИЧЛАРИДА ДАВО УСУЛЛАРИ

Маллаев М.М., Абдусатторов Р.А., Шаробидинов Б.Б.

Меъда ости бези саратони агрессив саратон турларидан бири ҳисобаланади, аммо унинг кечишида маҳсус белгилари мавжуд бўймаганлиги учун беморлар аксарият ҳолларда маҳаллий тарқалган ёки метастатик касаллик билан мурожаат қилишади. Бу эса даво чорасини танлашдаги ёндашувни қийинлаштиргани ҳолда даволаш натижарини кескин ёмонлашувига олиб келади. Мавжуд даволаш чоралари беморлар умумий яшовчанилигини яхшилагани билан касаллик прогнози ҳануз ўзгаришиз қўлмоқда. Ҳозирги кунда анъанавий даволаш натижаларининг самарасизлиги янги даво чораларини ишлаб чиқишини ва амалиётга тадбиқ этишини талаб этади.

Калит сўзлар: кимётерапия, маҳаллий тарқоқ меъда ости бези саратони, метастаз, таргет терапия, иммуно-терапия.