

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ
АССОЦИАЦИЯ ВРАЧЕЙ УЗБЕКИСТАНА**

**СБОРНИК
ТЕЗИСОВ И ДОКЛАДОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ**

**«СОВРЕМЕННАЯ РЕВМАТОЛОГИЯ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ К
ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ»**

Ташкент - 2022

Сборник тезисов и докладов международной научно-практической конференции// ООО «TIBBIYOT NASHRIYOTI MATBAA UYI» – 2022 г. 68 стр.

ТАХРИР ҲАЙЪАТИ/ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- Азизова Ф.Л.** – Тошкент тиббиёт академияси Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректор
- Мирахмедова Х.Т.** – 1-сон ички касалликлар пропедевтикаси кафедраси мудири
- Набиева Д. А.**– 1-сон факультет ва госпитал терапия, касб патологияси кафедраси мудири
- Дадабаева Н.А.** – -1-сон ички касалликлар пропедевтикаси кафедраси доценти, т.ф.н.
- Абдуллаев У.С.** – 1-сон ички касалликлар пропедевтикаси кафедраси ассистенти
- Ганиева Н. А.** – 1- сон факультет ва госпитал терапия, касб патологияси кафедрас ассистенти

Конференция метариаллари ревматологиянинг долзарб муаммолари, ревматологик касалликларни замонавий ташхислаш усуллари, даволашда замонавий инновацион ёндашувлар, коморбидлик ва мультиморбидлик муаммолари, ревматологик касалликларнинг реабилитацияси ва профилактика масалаларига бағишланган. Кенг учрайдиган ва асосий ревматологик касалликларда илмий тадқиқот ишлари натижалари илмий асослаб берилган.

© Ташкентская медицинская академия
© ООО«TIBBIYOT NASHRIYOTI MATBAA UYI», 2022

<i>Рахматов А.Б., Расулова Н.А.</i> Целесообразность применения биологических препаратов при лечении больных псориатическим артритом.....	41
<i>Рахматов А.Б., Расулова Н.А.</i> Ониходистрофия – предиктор псориатического артрита.....	42
<i>Rustamov R.SH., Sultonova M.X., Matchanov S.X.</i> Tizimli qizil yugurik bilan og'riqan bemorlarda buyraklar holatini klinik va funksional baholash.....	43
<i>Сагатов Д.Р., Муминова Н.И.</i> Влияние терапии диацереином на маркеры сосудистого поражения у больных остеоартрозом с коморбидной патологией.....	45
<i>Садикова С.И., Джалилова С.Х.</i> Особенности суставного синдрома у больных неалкогольной жировой болезнью печени перенесших sars-cov-2.....	46
<i>Saidrasulova G.B.</i> Early diagnosis of ankylosing spondylitis with magnetic resonance imaging.....	48
<i>Саипова М.Л., Мусаева Ш.З., Хатамова Д.Т., Зиямухамедова М.М.</i> Коррекция поражений легких при системной склеродермии.....	49
<i>Сафаров А. Ж., Камилова У.К.</i> Остеоартрит билан хасталанган беморларда даволовчи жисмоний машқларнинг самарадорлиги.....	51
<i>Турсунова М.У.</i> Влияние молекулярно-генетических аспектов и нестероидных противовоспалительных препаратов на клиническое течение язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.....	53
<i>Умаров А.Э.</i> Ревматоид артрит (pa) касаллигида анемик синдром.....	55
<i>Uralov R.Sh. Eshmuratov S.E.</i> Osteoartrit, bel soxasidagi og'riqlar va depressiya.....	56
<i>Uralov R.Sh., Eshmuratov S.E.</i> Tizimli sklerodermiyasi bo'lgan postmenopauzal ayollarda suyaklar mineral zichligining pastligi xavf omillari.....	57
<i>Miraxmedova X.T, Dadabaeva N.A, Karimova G.A, Hakimov E.E.</i> Vegener vaskuliti.....	58

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ ДИАЦЕРЕИНОМ НА МАРКЕРЫ СОСУДИСТОГО ПОРАЖЕНИЯ У БОЛЬНЫХ ОСТЕОАРТРОЗОМ С КОМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Сагатова Д.Р., Муминова Н.И.

*Ташкентская медицинская академия,
(Ташкент, Узбекистан).*

Цель. Оценить эффективность препарата диацереин при остеоартрите и его влияния на эндотелиальную дисфункцию у пациентов с коморбидной патологией – артериальной гипертензией.

Материалы и методы. В открытом проспективном когортном исследовании приняли участие 47 пациентов-женщин в возрасте от 44 до 69 лет, имеющих остеоартрит коленных суставов I-II стадии. Обследование проводилось в СКАЛЕ и в ревматологическом отделении первой клиники Ташкентской Медицинской Академии. Все включенные в исследование пациенты имели артериальную гипертензию I-II степени. Участники исследования были рандомизированы блочным методом на две группы: пациенты основной группы получали диацереин в дозировке 50 мг 2 раза в день и парацетамол, пациенты группы контроля получали только парацетамол. Для оценки степени выраженности эндотелиальной дисфункции использовался метод J. Hladovec (1978), принцип которого заключается в изоляции клеток эндотелия.

Результаты. В результате проведенного анализа было выявлено, что назначение диацереина в течение 45-дневного срока терапии статистически значимо эффективнее по сравнению с монотерапией парацетамолом: лечение диацереином в большей степени снижает значение индекса Лекена – на 1,0 балл (95% ДИ: 0,1; 1,9), в большей степени снижает выраженность болевого синдрома – на 10 мм (95% ДИ: 3; 17), а также снижает суточную потребность пациента в парацетамоле – на 323 мг (95% ДИ: 39; 608), по сравнению с монотерапией.

Заключение. Курс терапии диацереином в течение 45 дней в сочетании с парацетамолом эффективнее монотерапии парацетамолом: в большей степени снижает значение индекса Лекена – на 1,0 балл (95% ДИ: 0,1; 1,9), в большей степени снижает выраженность болевого синдрома – на 10 мм (95% ДИ: 3; 17), снижает суточную потребность в парацетамоле – на 323 мг (95% ДИ: 39; 608).