



Тошкент Фармацевтика
Институти



"Учинчи Ренессансда
Ибн Сино Издошлари"



Самарқанд Давлат
Тиббиёт Институти

"УЧИНЧИ РЕНЕССАНСДА ИБН СИНО ИЗДОШЛАРИ"

мавзусидаги талабалар учун
**Республика илмий амалий масофавий
конференцияси тұплами.**



**САМАРҚАНД ДАВЛАТ ТИББИЁТ ИНСТИТУТИ ҲАМДА ТОШКЕНТ
ФАРМАЦЕВТИКА ИНСТИТУТИ ҲАМКОРЛИГИДА ЎТКАЗИЛГАН
«УЧИНЧИ РЕНЕССАНСДА ИБН СИНО ИЗДОШЛАРИ» МАВЗУСИДАГИ
ТАЛАБАЛАР УЧУН ИЛМИЙ-АМАЛИЙ МАСОФАВИЙ
КОНФЕРЕНЦИЯСИ ТЕЗИСЛАРИ 2-СОН ТЎПЛАМИ.**

25 НОЯБРЬ 2021 ЙИЛ



ТАШКИЛИЙ ҚҮМИТА

Тошкент фармацевтика институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори –

Нормахаматов Нодирали Сахобаталиевич к.ф.д

Самарқанд Давлат Тиббиёт Институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича проректори –

Шуҳрат Худайбердиевич Зиядуллаев т.ф.д профессор

Тошкент Фармацевтика институти Иқтидорли талабалар илмий тадқиқот фаолиятини ташкил этиш бўлими бошлиғи -

Шерматова Ирода Бахтиёровна

Самарқанд Давлат Тиббиёт институти Иқтидорли талабалар илмий тадқиқот фаолиятини ташкил этиш бўлими бошлиғи -

Пайзуллаева Умидга Фурқатовна

Тошкент Фармацевтика институти Саноат фармацияси факультети 3-босқич талабаси –

Алланазарова Моҳира Бахтиёр қизи

Самарқанд Давлат Тиббиёт Институти Фармация факультети 3-босқич талабаси –

Ақбаров Аслиддин Тохир ўғли.

ТАҲРИР ҲАЙЪАТИ

Холмуродова Дилафруз Қувватовна т.ф.д (ДСс)

Юлдашев Соатбой Жиянбоевич т.ф.н доцент

Халиков Қаҳҳор Мирзаевич т.ф.н доцент

Кодиров Низомиддин Даминович (PhD)

Шарипов Авез Туймуродович к.ф.н. доцент.

Султонова Раъно Ҳакимовна f.f.f.d (PhD)

Олимов Хайрулло Каюмович ф.ф.н. доцент.

Фармонова Нодира Тахировна ф.ф.н. доцент



ТАБРИК СЎЗ

Хурматли конференция иштирокчилари!

Мен бугун Самарқанд давлат тиббиёт институтида ўтказилаётган “Учинчи ренессансда Ибн Сино издошлари” мавзусидаги республика илмий-амалий масофавий конференцияси билан барча қатнашчиларни қутлайман.

Конференцияни бу номда номланиши бежиз эмас. Мухтарам Президентимиз Ш. М. Мирзиёев ўз нутқларида учинчир ренесанс сўзига тўхталиб ўтгандилар “Биз кенг кўламли демократик ўзгаришлар, жумладан, таълим ислоҳотлари орқали Ўзбекистонда янги уйғониш даври, яъни Учинчи Ренессанс пойдеворини яратишни ўзимизга асосий мақсад қилиб белгиладик. Бу ҳақда гапирав эканмиз, аввало, учинчи Ренессанснинг мазмун-моҳиятини ҳар биримиз, бутун жамиятимиз чуқур англаб олиши керак”.

Самарқанд Давлат Тиббиёт Институтида олиб борилаётган барча ишлар аввалимбор бугунги кунда мухтарам Президентимизнинг соғлиқни сақлаш, фармацевтика соҳаларини ривожлантириш учун олиб бораётган ислоҳатларининг бир наъмунаси ҳисобланади. Самарқанд давлат тиббиёт институти ва Тошкент фармацевтика институти билан ҳамкорликда ташкил этилган бугунги конференция қатнашчиларига ва ташкилотчиларига ўз миннатдрчилигимни билдираман ва келгуси илмий фаолиятларингизга муваффақиятлар тилайман.

Самарқанд давлат тиббиёт институти ректори Ж. А. Ризаев т.ф.д профессор



Koronavirus infeksiyasi (Covid-19) dan keyin kelib chiqqan Tizimli vaskulitli bemorlarning klinik xususiyatlari va labarator tahlil natijalarini o'rganish.

Normuradov A.D Jurayeva E.R Agzamova G.S
Toshkent Tibbiyat Akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston.

Tadqiqot maqsadi: Koronavirus infeksiyasi (Covid-19) dan keyin kelib chiqqan Tizimli vaskulitli bemorlarning klinik xususiyatlari va labarator tahlil natijalarini o'rganish.

MATERIALLAR VA USULLAR. Tadqiqot manbai sifatida Toshkent Tibbiyat Akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasining Revmatologiya va Kardiorevmatologiya bo'limalarda davolangan 40 nafar (asosiy guruhi- 20 nafar, nazorat guruhi - 20 nafar) Tizimli vaskuliti bor bemorlar, tanlandi. Barcha bemorlarda klinik xususiyatlar va labarator tahlil natijalari o'rganib chiqildi.

Tadqiqot natijalari. Asosiy guruhi bemorlarning 60 foizida Gemorragik vaskulit kasalligi aniqlandi: bemorlarda klinikada febril temperatura ($39-40^{\circ}\text{C}$), 8-10 mmli yirik diskoid toshmalar paypaslanuvchi Shenley Genox purpurasining uzoq muddat saqlanishi, bu toshmalarning butun tana bo'ylab tarqalishi, toshmalar toshishining 5-6 to'lqinini, bo'g'im sindromining asosan yirik bo'g'implarda poliartrit mialgiya simmetrik og'riqdan tashqari yaqqol deformatsiyalar bilan kechishi davomiyligi (2 oygacha) bo'lishi; abdominal sindrom esa kuchli dispeptik shikoyatlardan tashqari oshqozon ichakdan kuchli qon ketish ichaklar perforatsiyasi hamda yiringli peritonit bilan asoratlanishi; Buyraklarda nefrotik sindrom arterial gipertensiya persistirlovchi gematuriya va proteinuriya natijasida surunkali buyrak yetishmovchiligi kuzatildi; Nerv tizimi tomondan esa subdural gematomalar hamda kam holda miya infarkti paydo bo'ldi; Laborotor tekshiruvda immunologiyada asosan SARS COV-2 Ig M (-), Ig G(+) antistreptolizin O titri 780,8 (normada 200 ul/ml), S reaktiv oqsil 45,4 (normada 6 mg/ml), Revmafaktor esa 39,5 (normada 20 ul/ml); Autoimmun tekshiruvda Antinuklear antitela 29,6 (normada 0-25 ME/ml); Antineytrofil antitela 10,45 (normada 1 dan oshsa musbat hisoblanadi). Bu ko'rsatkichlar o'rtacha olindi va nazoratdagi bemorlarga qaraganda birmuncha yuqori chiqdi. Asosiy guruhi bemorlarning 30 foizida Vegener granulematozi klinikasi kuzatildi: bemorlarda burundan nafas olish qiyinligi yiringli qon ajralmalar kelishi, qon tupurish hamda yiringli qon aralash balg'am kelishi, yarali stomatit, yiringli otit, bakterial konyuktivit, yarali nekrotik traxeobronxit hamda krupoz zotiljam og'ir kechishi natijasida o'tkir nafas yetishmovchiligi bilan asoratlanishlar kuzatildi. Buyraklarda esa tez rivojlanib zo'rayib boruvchi glomerulonefrit oqibatida o'tkir buyrak yetishmovchiligi kuzatildi. Laborotor tahlilda S reaktiv oqsil 28,7 (N-6), revmofaktor 32,9 (N-20), ASLO-640,5 (N-200), ANA-18,7 (N 0-25), ANCA- 10,67 (>1 musbat), SARS COV-2 Ig M (-), Ig G(+). Qolgan 10 foiz bemorlarda Tugunchali poliartrit klinikasi kuzatildi: asosan yirik bo'g'implarda diametri 10 mmdan oshadigan eritematoz, vezikulyar toshmalar, papulalar, gemorragiya va nekroz o'choqlari poliartrit ko'rinishida, tomirlar paypaslanganda 2-3 sm keladigan teri osti tugunchalar aniqlandi. Buyraklarda arterial gipertensiya nefropatiyalar, geektik temperature ($>42^{\circ}\text{C}$), yurakda perikardit, kardiomiopatiyalar, miokard infarkti; bronxial astma belgilari, nerv tizimida polinevrit, paresteziya hamda epidural gematomalar kuzatildi. Laborotoriyada Hbs antigen (+), S reaktiv oqsil 19,7 (N-6), revmofaktor 32,4 (N-20), ASLO-580,5 (N-200), ANA-16,7 (N 0-25), ANCA- 10,56 (>1 musbat), SARS COV-2 Ig M (-), Ig G(+) ekanligi aniqlandi.

Xulosa: Olingan ma'lumotlarga ko'ra asosiy guruhi bemorlarda Tizimli vaskulitlar klinik variantlarini klinik kechishi nazorat guruhi bemorlarga nisbatan o'tkir hamda ko'plab a'zo tizimlar zararlanishi bilan og'ir asoratli kechishi va labarator tahlilda ham birmuncha yuqori ko'rsatkichlar aniqlandi. Ya'ni Koronavirus infeksiyasidan keyin kelib chiqqan Tizimli vaskulitlar poliorgan zararlanishi bilan o'tkir kechib og'ir asoratlar bilan namoyon bo'lishi qayd etildi. Koronavirus infeksiyasi Tizimli vaskulitlar rivojlanishiga uni og'ir asoratlar bilan kechishiga trigger bo'lib xizmat qilishi isbotlandi.