

ISSN 2181-5674

PROBLEMS OF
BIOLOGY *and*
MEDICINE

БИОЛОГИЯ *ва*
ТИББИЁТ
МУАММОЛАРИ

2022, № 2 (135)

Эргашев В.А. Үткір ва сурункали тажрибавий остеомиелитлар динамикасыда иммун тизим хужайралари ўзгаришлар хусусиятларини қиёсий күрсаткычлари	184
Эшкабилова С.Т., Эшкабилов Т.Ж. Фетоплацентарная недостаточность как одна из причин перинатальной летальности	189
Обзор литературы	
Бойкузиеv X.X., Джуракулов B.I., Курбонов X.P.	192
Сут эмизувчи ҳайвонлар ингичка ичаги ва чувалчансимон үсимтаси нерв тизими мор- фологияси ҳақида мулоҳазалар	195
Даминова Н.Р., Азизова Ш.Ш., Садикова И.Э., Ходжаева Ф.Х.	199
Периодонтитни даволашда замонавий усуллар	203
Жумаева Г.А., Усманходжасеева А.А. Современные взгляды на диагностику гипертонической болезни	208
Искандарова Д.Э., Усманова Д.Дж. Инсулт миллій регистри: нималарни үрганиш имконини беради?	214
Исмаилова М.Х., Хайтбаева М.Р., Таирова М.И.	224
Визуализация опухолей яичников	229
Рузиков О.Ш., Жураев И.Г., Хамидов О.А., Келдиаров А.Х., Мансуров Дж.Ш., Садуллаев О.А.	235
Насколько необходима оптимизация ведения больных с переломом шейки бедренной кости?	240
Тилляшайхов М.Н., Рахимов О.А., Адылходжаев А.А., Юнусов С.Ш. Инвазивная диагностика колоректального рака	246
Хакимова Л.Р., Юсупов Ш.А., Хусинова Ш.А., Шамсиев Ж.А. Болаларда уролитиаз ривожланишига генетик омилларнинг таъсири	251
Хамдамова М.Т., Уринова Ш.А. Тиббий таълимда замонавий инновацион ёндашувлар юқори малакали шифокорлар тайёрлашнинг муҳим омили	
Холмуродова Д.К., Рахманова Ф.Э. Синтетические, натуральные и полусинтети- ческие полимерные вещества для antimик- робных, ранозаживляющих кожных лечебных препаратов	
Шадиева Ш.Ш., Расурова С.М. Оро-антрал нұқсон(алоқа)ни даволаш методларига замонавий қараашлар	
Ярмухамедова Н.А., Джумаева Н.С. ОИВ инфекцияси билан касалланған беморларда COVID-19 касаллиги кечиши хусусиятлари	

Ergashev V.A. Comparative indicators of the characteristics of changes in immune system cells in the dynamics of acute and chronic experimental osteomyelitis	184
Eshkabilova S.T., Eshkabilov T.J. Fetoplacental insufficiency as one of the causes of the perinatal mortality	189
Review of the literature	
Boykuziev Kh.Kh., Djurakulov B.I., Kurbanov Kh.R.	192
Questions of the morphology of the nervous sys- tem of the small intestine and appendix in mammals	195
Daminova N.R., Azizova Sh.Sh., Sadikova I.E., Khojaeva F.H.	199
Modern methods of treatment of periodontitis	203
Jumaeva G.A., Usmankhodjaeva A.A.	208
Modern views in the diagnosis of hypertension disease	
Iskandarova D.E., Usmanova D.Dj.	214
National registers of stroke: what can we learn from them?	224
Ismailova M. K., Khaitbayeva M.R., Tairova M.I.	229
Imaging of ovarian tumors	
Ruzikulov O.Sh., Juraev I.G., Khamidov O.A., Keldiyarov A.Kh., Mansurov J.Sh., Sadullaev O.A.	235
How is optimization of the management of patients with a fracture of the femoral neck?	240
Tillyashaykhov M.N., Rakhimov O.A., Adylkhodjaev A.A., Yunusov S.Sh.	246
Invasive diagnostics of colorectal cancer	
Khakimova L.R., Yusupov Sh.A., Khusinova Sh.A., Shamsiev J.A.	251
Influence of genetic factors on the development of urolithiasis in childhood	
Khamdamova M.T., Urinova Sh.A.	
Modern innovative approaches in medical education is an important factor in the training of highly qualified doctors	
Kholmurodova D.K., Rakhamanova F.E.	
Synthetic, natural and semi-synthetic polymeric substances for antimicrobial, wound-healing skin medicines	
Shadiyeva Sh.Sh., Rasulova S.M.	
Modern views on methods of treatment of oro- antral communication of the upper jaw	
Yarmukhamedova N.A., Djumaeva N.S.	
Features of the current COVID-19 in HIV infected patients	



Исмаилова Муножат Хаятовна, Хайтбаева Мухайё Равшановна, Таирова Мадина Илхамовна
Ташкентская Медицинская Академия, Республика Узбекистан, г. Ташкент

ТУХУМДОН ЎСМАЛАРИНИ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ҚИЛИШ

Исмаилова Муножат Хаятовна, Хайтбаева Мухайё Равшановна, Таирова Мадина Илхамовна
Тошкент Тиббиёт Академияси, Ўзбекистон Республикаси, Тошкент ш.

IMAGING OF OVARIAN TUMORS

Ismailova Munojat Khayatovna, Khaitbayeva Muhayo Ravshanovna, Tairova Madina Ilkhamovna
Tashkent Medical Academy, Republic of Uzbekistan, Tashkent

e-mail: info@tta.uz

Резюме. Сўнгги ўн йил ичида магнит-резонанс томография (МРТ) га бўлган талаб диагностика усули сифатида сезиларли даражада ошиди, чунки тўқима хусусиятидағи фарқлар асосида тўқима контрастини яратиш учун мисли кўримлаган салоҳиятга эга. Тўқиманинг тузилиши ва функсияси ҳақидаги маълумотларни сонография йўли билан ҳам олиш мумкин. Бундан ташқари, MSCT тадқиқотларда фақат унинг тухумдан саратонинг ривожланишининг охирги босқичларида ташхислаш мумкин.

Калим сўзлар: магнит-резонанс томография, TNM, тухумдан саратони таснифи, босқичлаш, тухумдан.

Abstract. Over the past ten years, the demand for magnetic resonance imaging (MRI) has increased markedly as a diagnostic method, as it has unprecedented potential to create tissue contrast based on differences in tissue properties. Information about the structure and function of the tissue can also be obtained by sonography. In addition, MSCT studies can be used in the diagnosis of ovarian cancer, but only in the later stages of its development.

Keywords: magnetic resonance imaging, TNM, classification of ovarian cancer, staging, ovary.

Введение. Рак яичников в настоящее время является одной из наиболее распространенных форм рака среди женщин во всем мире, являясь причиной 3,6% всех случаев со смертностью 4,3% [1,2,3].

Важной причиной высокого уровня смертности от этого рака этого типа – поздняя его диагностика. Многие пациенты находятся на поздней стадии, главным образом потому, что заболевание часто протекает бессимптомно или ассоциируется с неспецифическими симптомами на ранней стадии. Случайное обнаружение образования яичника очень распространено в клинической практике.

Средний возраст женщин, у которых выявляют эти новообразования, составляет 20 лет. Их доля в структуре онкологической заболеваемости такова: 81% злокачественных новообразований яичников у подростков и 6% всех опухолей яичников. Негермиогенные опухоли яичников встречаются у женщин после 50 лет. У них в 66% случаев выявляют аденокарциномы [2].

Этиопатогенез опухолей яичников не полностью ясен, тем не менее, он представляется

многофакторным. Считается, что в 70% случаев развитию новообразования способствуют нарушения гормонального гомеостаза. 30% группы риска составляют женщины, которые никогда не рожали, или имеют в анамнезе много беременностей [4,5].

В 25% женщин рак яичников развивается по причине множества абортов. У 78% пациенток, которым поставлен диагноз «рак яичников», выявлен отягощенный семейный анамнез. Приём гормональных контрацептивов на 50% уменьшает риск развития рака придатков матки. 58% женщин, заболевших этой патологией, курили и употребляли в больших количествах спиртные напитки [6,7].

Первичные опухоли яичников можно разделить на три основные категории по происхождению опухоли: эпителиальные, опухоли из зародышевых клеток и половые стромальные опухоли; яичники также поражаются метастатическими опухолями. В 66,7% случаев встречается серозная аденокарцинома, в 11,2% пациенток определяют муциновый тип опухоли, в 11,2% - эндометрио-

идный. Светлоклеточный морфологический вариант аденокарциномы определяют у 5,4% женщин, а недифференцированные клетки находят в 5,4% исследуемого материала [8].

Эпителиальные опухоли насчитывают примерно на 85% от злокачественных образований яичников: наиболее распространенный тип среди них - серозная карцинома. Дермоидная киста (зрелая кистозная тератома) является наиболее распространенным доброкачественным новообразованием яичников. Новообразования полового тяжа могут вырабатывать гормоны, как эстрогены, так и андрогены, что проявляется эндокринологическими симптомами. Новообразования яичников могут быть доброкачественными, пограничными или злокачественными. Кроме того, следует учитывать некоторые доброкачественные поражения, а именно функциональные и геморрагические кисты, а также эндометриомы.

Гистологическая классификация опухолей яичников по ВОЗ

Первичные опухоли они составляют (95%) и поверхностные эпителиально-стромальные опухоли (65%).

Серозные:

Доброкачественные (цистаденома, папиллярная цистаденома, аденофиброма/цистаденофиброма)

Пограничные (папиллярно-кистозная опухоль, поверхностная папиллярная опухоль, аденофиброма/цистаденома)

Злокачественные (аденокарцинома, поверхностная папиллярная аденокарцинома, аденоиномафиброма)

Муцинозные:

Доброкачественные (цистаденома, аденофиброма/цистаденофиброма)

Пограничные (кишечный тип, эндоцервикально-подобная)

Злокачественные (аденокарцинома, аденоиномафиброма)

Эндометриоидные

Прозрачноклеточные

Переходноклеточные (Бреннера)

Недифференцированные и неклассифицированные

Тератома:

Двух- или трёхфазная (зрелая/незрелая)

Монодермальная (*Struma ovarii*)

Дисгерминома

Опухоль желточного мешка

Хориокарцинома

Карцинома из эмбриональных клеток

Опухоль из клеток гранулёзы (Взрослая/Ювенильная)

Группа текомы-фибромы

Фиброма/текома

Склерозирующая стромальная опухоль

Неклассифицированная (фибротекома)

Опухоль из клеток Сертоли-Лейдига

Стероидноклеточная

Вторичные опухоли (5%): с подгруппой разные которые также составляют 5%.

Мелкоклеточная карцинома, гестационная хориокарцинома, другие опухоли желудка, толстого кишечника, молочной железы, лёгких, контрапатерального яичника

Стадирование. Имеются 2 системы стадирования для описания распространения опухолей яичников: TNM (опухоль, узел, метастазы) и Международной федерации гинекологии и акушерства (FIGO).

Диагностическая визуализация. Диагностическая визуализация играет решающую роль в обнаружении, характеристике и стадировании образований яичников.

УЗИ является первым методом визуализации, выполняемым при оценке состояния яичников, потому что он широко доступен, хорошо воспринимается пациентами. Сочетание характеристик серошкольного и цветного доплера, полученных при трансабдоминальном и / или эндогинальном сканировании, позволяет получать морфологическую сосудистую структуру образований яичников [21,22]. Морфологические признаки, указывающие на злокачественность, включают толщину (> 2-3 мм) и неровности стенок и перегородок, наличие солидных или папиллярных включений, а также другие признаки злокачественности процесса, а именно асцит, увеличенные лимфоузлы и метастатические поражения [6,23].

В ультразвук-неопределемых образованиях придатков допплеровское ультразвуковое исследование показало 84% чувствительность и 82% специфичность при диагностике рака Ву и др., в недавнем метаанализе десяти независимых исследований, сообщили о высокой диагностической точности контрастно усиленного УЗИ при различении между собой доброкачественных и злокачественных образований яичников.

Компьютерная томография (КТ) брюшной полости и таза с введением контраста важна как для оценки распространённости злокачественного поражения, так и для выявления рецидивов после лечения, тогда как она имеет ограниченную ценность при первичном обнаружении и характеристике образований яичников. При КТ-сканировании только те поражения, которые содержат жировую ткань и кальцификаты, такие как зрелые тератомы, можно охарактеризовать без затруднений. В сонографически неопределемых образованиях яичников КТ показала чувствительность 81% и специфичность 87% в диагностике рака яичника [8,24,25].

Таблица 1. Система FIGO для стадирования рака яичников

I стадия	Опухоль ограничена яичниками
I A	Опухоль ограничена 1-м яичником, капсула интактна, нет опухоли на поверхности, отрицательные смывы
I B	Опухоль вовлекает оба яичника, остальное как при I A
I C	Опухоль ограничена 1-м или обоими яичниками
	I C1 Хирургическое вскрытие
	I C2 Разрыв капсулы до хирургического вмешательства или опухоль на поверхности яичника
	I C3 Злокачественные клетки в асцитической жидкости или перитонеальных смывах
II стадия	Опухоль вовлекает 1 или оба яичника с тазовым распространением (ниже тазового кольца) или первичный рак брюшины
II A	Распространение и/или имплантация к матке и/или маточным трубам
II B	Распространение на другие тазовые внутрибрюшинные ткани
III стадия	В процесс вовлечен 1 или оба яичника с цитологически или гистологически подтверждённым распространением на брюшину за пределами таза и/или метастазы в ретроперитонеальные лимфоузлы
III A	Позитивные ретроперитонеальные лимфатические узлы и/или микроскопические метастазы к тазу
	Только позитивные ретроперитонеальные лимоузлы
	Микроскопическое, внетазовое (над входом в таз) вовлечение брюшины + позитивные ретроперитонеальные лимфоузлы
III B	Макроскопические, внетазовые, брюшинные метастазы $\leq 2\text{ см}$ + позитивные ретроперитонеальные лимфоузлы. Включает распространение на капсулу печени/селезенки
III C	Макроскопические, внетазовые, брюшинные метастазы $> 2\text{ см}$ + позитивные ретроперитонеальные лимфоузлы. Включает распространение на капсулу печени/селезенки
IV стадия	Отдалённые метастазы, включая перитонеальные
IV A	Плевральный выпот с позитивной цитологией
IV B	Печёночные и/или селезёночные паренхиматозные метастазы, метастазы во внебрюшные органы (включая паховые и внебрюшные лимфоузлы)

КТ — это метод визуализации выбора при определении стадии процесса: ориентируясь на сальниковую и брюшинную имплантацию, асцит и лимфаденопатию очень важно оценить протяжённость процесса. Оценка ответа на терапию обычно выполняется с помощью КТ, в сравнении сканов до и после лечения (предпочтительно после шести циклов химиотерапии). Интервал между КТ-сканированием продолжительностью всего в три цикла химиотерапии показан, если сывороточные маркеры отрицательные или их уровни не снижаются [15,17].

18F-FDG ПЭТ/КТ сканирование используется все чаще, и его роль в оценке опухолей яичников, по-видимому, имеет решающее значение в послеоперационном наблюдении за пациентами с подозрением на рецидив [9,29,30]. Но, ПЭТ /КТ обычно не выполняется при первоначальной оценке этих пациентов, главным образом потому, что это может привести как к ложноположительным, так и к ложноотрицательным результатам. Следует учитывать, что некоторые доброкачественные поражения, особенно тератомы и эндометриомы, могут показывать поглощение ФДГ, тогда как небольшие (<1 см), некротические и низкодифференцированные опухоли не могут его

не выявить [4]. Однако, повышенное поглощение ФДГ у женщин в постменопаузе всегда следует считать аномальным [10,11,15].

Магнитно-резонансная томография (МРТ) является решающим проблему определения места возникновения тазового образования методом, а впоследствии — характеристики образований яичников, особенно у пациентов с неопределяемыми поражениями. МРТ также надежна в обнаружении локальной инвазии. Основными преимуществами МРТ являются: высокое пространственное разрешение с отличным тканевым контрастом и отсутствие воздействия ионизирующего излучения, что особенно важно для молодых женщин.

Для получения анатомической информации и изучения морфологических и характеристик интенсивности сигнала образования требуются как T1-, так и T2-взвешенные последовательности. Жироподавленные T1-взвешенные изображения полезны для обнаружения геморрагических областей и жировой ткани. Использование внутривенного введения гадолиния улучшает обнаружение усиленных перегородок и солидных компонентов в опухоли, а также перитонеальной и сальниковой имплантации. При оценке придаточных масс, неопределяемых на УЗИ, МРТ без уси-

ления показала чувствительность и специфичность 76 и 97% соответственно при диагнозе рак яичников; МРТ с контрастным усилением - чувствительность до 81% и специфичность до 98% [8,14,16].

Диффузионно-взвешенная визуализация (DWI) является потенциально полезным методом оценки образований яичников. В 2009 году Томассин-Наггара и другие продемонстрировали, что комбинация диффузионно-взвешенных и T2-взвешенных изображений полезна для прогнозирования доброкачественности и злокачественности: массы с низкой интенсивностью сигнала на обеих последовательностях были более вероятно доброкачественными, тогда как поражения с высокointенсивным сигналом на DWI и промежуточным сигналом на T2-взвешенных изображениях были преимущественно злокачественными [7,16,17]. Относительно недавно другие исследования [18, 19] показали, что высокая интенсивность сигнала на DWI чаще встречается при злокачественных поражениях и полезна для дифференциации их от доброкачественных. Следует учитывать, что несколько доброкачественных поражений, а именно эндометриомы, тератомы также могут иметь ограниченную диффузию; однако, уверенная диагностика этих поражений обычно может быть сделана с T1-взвешенной, T1-взвешенной жироподавленной и T2-взвешенной стандартными последовательностями [20,23,24].

По нашему мнению, диффузионно-взвешенные изображения должны быть включены в МРТ протокол. Роль 1,5 Т МРТ в оценке массы яичников была широко установлена, но только в последние годы 3 Т системы были применены при изучении гинекологических заболеваний.

Протонная МР-спектроскопия — это неинвазивный диагностический метод, который может способствовать дифференциальной диагностике подтипов овариальных опухолей. В дополнение к системе 1,5 Т спектральное разделение и увеличенное отношение сигнал / шум с помощью трех Т-систем обеспечивают высококачественную МР-спектроскопию [11,19,20,22]. Различные подтипы злокачественных опухолей яичников эпителия (серозный, прозрачноклеточный, эндометриоидный и муцинозный) реагируют на химиотерапию по-разному. В частности, серозная аденоарцинома может иметь хороший ответ на химиотерапию, тогда как прозрачноклеточная и муцинозная аденоарциномы могут давать плохой ответ на химиотерапию. Протонная МР-спектроскопия может идентифицировать наличие муцинозного материала, содержащего N-ацетил муцинозные соединения и может предоставлять полезную информацию при различении муцинозных и немуцинозных опухолей яичников [12,24].

Таким образом, МР спектроскопия помогает диагностировать подтипы овариальных опухолей и может способствовать адекватному лечению, таким образом улучшая ведение этих пациентов.

Используя визуализационный подход, основанный на морфологическом происхождении, мы классифицировали образования придатков на четыре основные группы:

- однокамерная киста;
- многокамерная киста;
- кистозные и мягкотканые;
- преимущественно мягкотканые.

Классификация образований придатков на основании их морфологического вида

A. Кистозные однокамерные (доброкачественные):

- 1. Не яичниковые
 - Параовариальные кисты
 - гидросальпинкс, пиосальпинкс и гематосальпинкс

- 2. Яичниковые
 - Функциональные кисты
 - серозные цистаденомы (часто)
 - Цистаденофибромы и муцинозная цистаденома (реже)

B. Кистозные многокамерные (доброкачественные и пограничные):

- Эндометриомы
- муцинозные цистаденомы
- пограничные опухоли (часто)
- серозные цистаденофибромы (реже)
- доброкачественные (зрелая кистозная тератома)

C. Кистозные и мягкотканые:

- 1. Озлокачествляющиеся пограничные
 - Поверхностные эпителиальные опухоли
 - метастазы, опухоли желточного мешка, опухоли Сертоли-Лейдига

D. Преимущественно мягкотканые (доброкачественные, пограничные и злокачественные):

- 1. Доброкачественные
 - Опухоль Бреннера, фибротекомы
 - 2. Озлокачествляющиеся пограничные
 - Серозные карциномы
 - муцинозные карциномы
 - дисгерминома
 - опухоль желточного мешка
 - опухоли из гранулёзы и клеток Сертоли-Лейдига, метастазы

Затем мы оценивали признаки интенсивности сигнала (например, геморрагические области, повышенное содержание белка, жира и коллагеновой ткани) и характер усиления при каждом поражении.

Заключение. Морфологические характеристики образований яичников варьируются между

кистозными (как однокамерными, так и многокамерными), сложными (кистозными и мягкотканными) и преимущественно мягкотканными. В 2011 году Valentini и др. предложили критерии для характеристики доброкачественных и подозрительных поражений яичников, указывающие как признаки для предположения злокачественности демонстрацию «мягкотканых, мягкоткано-кистозных усиливающихся образований [15].

В заключении мы хотели бы указать некоторые ключевые свойства и рекомендации, которые могут помочь в дифференциальной диагностике образований яичников:

- неопластические поражения всегда должны приниматься на рассмотрение;
- у пациенток с эндометриозом наличие сложного и быстро растущего образования с контрастным усилением должно усилить подозрение на эндометриоидную или прозрачноклеточную опухоль;
- очень низкая интенсивность сигнала на Т2-взвешенных изображениях указывает на фиброзный компонент, предполагающий опухоль из группы теком/фибром, цистаденофиброму или опухоль Бреннера;
- последовательности с жиронасыщением полезны при выявлении образований с высокой интенсивностью сигнала на Т1-взвешенных изображениях, потому что подавление сигнала указывает на тератомы; в противном случае, кисты эндометрия или другие следует учитывать геморрагические поражения.

Литература:

1. Ferlay J, Soerjomataram I, Ervik M, Dikshit R, Eser S, Mathers C, Rebelo M, Parkin DM, Forman D, Bray F (2013) GLOBOCAN 2012 v1.0, Cancer Incidence and Mortality Worldwide: IARC Cancer Base No. 11. Lyon, France: International Agency for Research on Cancer. Available via <http://globocan.iarc.fr>, accessed on 01/03/2015
2. Holschneider CH, Berek JS (2000) Ovarian cancer: epidemiology, biology, and prognostic factors. *Semin Surg Oncol* 19(1):3–10
3. World Health Organization Classification of Tumours (2003) Pathology and genetics of tumours of the breast and female genital organs. IARC
4. Son H, Khan SM, Rahaman J, Cameron KL, Prasad-Hayes M, Chuang L et al (2011) Role of FDG PET/CT in staging of recurrent ovarian cancer. *Radiographics* 31(2):569–83. doi:10.1148/rg.312105713
5. Holcomb K, Vucetic Z, Miller MC, Knapp RC (2011) Human epididymis protein 4 Offers superior specificity in the differentiation of benign and malignant adnexal masses in premenopausal women. *Am J Obstet Gynecol* 205(4):358.e1–6. doi:10.1016/j.ajog.2011.05.017
6. Bandiera E, Romani C, Specchia C, Zanotti L, Galli C, Ruggeri G et al (2011) Serum human epididymis protein 4 and risk for ovarian malignancy algorithm as new diagnostic and prognostic tools for epithelial ovarian cancer management. *Cancer Epidemiol Biomarkers Prev* 20(12):2496–506. doi: 10.1158/1055-9965.EPI-11-0635
7. Jeong YY, Outwater EK, Kang HK (2000) Imaging evaluation of ovarian masses. *Radiographics* 20(5):1445–70
8. Iyer VR, Lee SI (2010) MRI, CT, and PET/CT for ovarian cancer detection and adnexal lesion characterization. *AJR Am J Roentgenol* 194(2):311–21. doi:10.2214/AJR.09.3522
9. Wu Y, Peng H, Zhao X (2015) Diagnostic performance of contrastenhanced ultrasound for ovarian cancer: a meta-analysis. *Ultrasound Med Biol* 41(4):967–74. doi:10.1016/j.ultrasmedbio.2014.11.018
10. Levine D, Brown DL, Andreotti RF, Benacerraf B, Benson CB, Brewster WR et al (2010) Society of Radiologists in Ultrasound. Management of asymptomatic ovarian and other adnexal cysts imaged at US Society of Radiologists in Ultrasound consensus conference statement. *Ultrasound Q* 26(3):121–31. doi:10.1097/RUQ.0b013e3181f09099
11. Lalwani N, Prasad SR, Vikram R, Shanbhogue AK, Huettner PC, Fasih N (2011) Histologic, molecular, and cytogenetic features of ovarian cancers: implications for diagnosis and treatment. *Radiographics* 31(3):625–46. doi:10.1148/rg.313105066
12. Prakash P, Cronin CG, Blake MA (2010) Role of PET/CT in ovarian cancer. *AJR Am J Roentgenol* 194(6):W464–70. doi:10.2214/AJR.09.3843
13. Chilla B, Hauser N, Singer G, Trippel M, Froehlich JM, Kubik-Huch RA (2011) Indeterminate adnexal masses at ultrasound: effect of MRI imaging findings on diagnostic thinking and therapeutic decisions. *Eur Radiol* 21(6):1301–10. doi:10.1007/s00330-010-2018-x
14. Togashi K (2003) Ovarian cancer: the clinical role of US, CT, and MRI. *Eur Radiol* 13(Suppl 4):L87–104
15. Fujii S, Kakite S, Nishihara K, Kanasaki Y, Harada T, Kigawa J et al (2008) Diagnostic accuracy of diffusion-weighted imaging in differentiating benign from malignant ovarian lesions. *J Magn Reson Imaging* 28(5):1149–56. doi:10.1002/jmri.21575
16. Katayama M, Masui T, Kobayashi S, Ito T, Sakahara H, Nozaki A et al (2002) Diffusion-weighted echo planar imaging of ovarian tumors: is it useful to measure apparent diffusion coefficients? *J Comput Assist Tomogr* 26(2):250–6
17. Thomassin-Naggara I, Daraï E, Cuenod CA, Fournier L, Toussaint I, Marsault C et al (2009) Contribution of diffusion-weighted MR imaging for predicting benignity of complex adnexal masses. *Eur*