



DIASTOLIC DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE LATE AFTER CORONARY STENTING

Umarova Z.F.
Jabbarov O.O.
Saydaliyev R.S.
Jumanazarov S.B.
Radjapov A.B.

Tashkent Medical Academy

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7726819>

Objective: To evaluate the diastolic left ventricular function in the 9-year prospective follow-up after endovascular myocardial revascularization in patients with restenosis and without restenosis of coronary stents.

Material and Methods: The study involved 258 patients with coronary heart disease (cf. age $49,5 \pm 0,7$ years.). In 153 patients (1 group), carried out a successful endovascular revascularization (ER), was not required in the long term repeat interventions for stent restenosis; in 105 patients reintervention for restenosis of coronary stents after primary stenting spacecraft performed several times (2 group).

At baseline and after 1, 3, 5, 7 and 9 years after stenting was performed according to echocardiography left ventricular diastolic function in patients with analysis groups depending on the degree of impairment of LV systolic function at the time of inclusion in the study: subgraphs. A (LVEF > 45%), subgraphs. B (LVEF 40-45%), subgraphs.C (LVEF <40%).

Results: At the time of inclusion in the study in patients without repeated interventions for stent restenosis (1st c.) Was diagnosed left ventricular diastolic dysfunction (DD) I of the type - 86.4% (subgraphs. A), significantly less ($\chi^2 = 26,31$, $df = 2$, $p = 0,0002$) recorded DD type II and III. Diastolic function (DF) LV 1 year after stenting has improved in 10% of patients in the subgroup A and 50% in the subgroup B by reversion of the II and III DD types Type I and normal diastolic function. After 3 years, 2.7% and 20% of A and B were recorded improved LV DF, which provided statistically significant between-group differences. At subsequent stages of the structure of violations of DF in the 1st c. not undergone obvious changes. In patients with multiple reoperations (2 group) The initial period dominated by Type I diastolic dysfunction, but half of the patients identified subgroup C Type II disorders diastole ($p = 0.04$). After 1 year, the type of DD in subgroups were not significantly changed, and the third year of observation in the subgroups with moderately reduced and reduced <40% LVEF marked deterioration in DF due to the transition to a more severe



type of dysfunction ($p = 0.0005$). After 5 years after CA stenting violation of DF in the subgroup of patients with EF <40% continued to worsen ($p = 0.001$). 7 and 9 years signi. cant dynamics of ventricular diastolic dysfunction were not observed. Noteworthy is the fact that if, in the subgroup of patients with preserved left ventricular ejection fraction is practically unchanged, while in the group with repeated ER noted its gradual decline, more pronounced in the subgroup with baseline reduced ejection fraction (<40%).

Conclusions: in patients without restenosis of coronary stents, regardless of initial LVEF showed improvement in left ventricular diastolic function by the reversal of type II and III to type I DD. Patients with repeated restenosis of coronary stents and reduced LVEF was recorded progressive deterioration of left ventricular diastolic function due to the rise of CHF.

References:

1. Низамова, Н. Г., Максудова, М. Х., & Жуманазаров, С. Б. (2021). Изучение зависимости приобретенных пороков сердца от степени поражения клапана у пациентов с хронической сердечной недостаточностью. Моя профессиональная карьера, 1(24), 7-19.
2. ЙУЛДОШЕВ, Т. Р., Жаббаров, О., Максудова, М., & Жуманазаров, С. Оценка поражения желудочно-кишечного тракта у больных хронической болезнью почек III-IV стадии и пути их коррекции. АХБОРОТНОМАСИ, 95, 33.
3. Рўзметова, О., Жаббаров, О., Қодирова, Ш., Жуманазаров, С., & Рахматов, А. (2022). Сурункали буйрак касаллиги II-III босқичларидағи беморларда гипоазотемик даволаш самарадорлигини ўрганиш.
4. Исломова, М., Жаббаров, О., Умарова, З., & Жуманазаров, С. (2022). Сурункали буйрак касаллукларини даволашда антиоксидант препаратлардан фойдаланиш.
5. Эшонкулов, Ж. Х., Жаббаров, О. О., Умарова, З. Ф., Мадазимова, Д. Х., & Жуманазаров, С. Б. (2022). COVID-19 Инфекцияси үтказган bemorларда буйракларнинг заарланиш патогенези.
6. Мирзаева, Ш. Х., Жаббаров, О. О., Максудова, М. Х., Турсунова, Л. Д., & Жуманазаров, С. Б. (2022). Сурункали буйрак касаллиги бўлган bemorларда кардиоренал синдромни даволаш.
7. Umarova, Z. F., Tursunova, L. D., Maksudova, M. X., Xodjanova, S. I., Mirzayeva, G. P., & Nadirova, Y. I. (2023). DIASTOLIC DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE LATE AFTER CORONARY STENTING (Doctoral dissertation).



8. Умарова, З. Ф., Кучкарова, Ш. А., & Султонов, Н. Н. (2022). РОЛЬ БЛОКАТОРОВ КАЛЬЦИЕВЫХ КАНАЛОВ В ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПОЧЕК. ІЖТІМОІЙ FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI, 2(1), 126-132.
9. Жаббаров, О. О., Умарова, З. Ф., Турсунова, Л. Д., Нодирова, Ю. И., Сайдалиев, Р. С., Жуманазаров, С. Б., & Хужаниязова, Н. К. (2023). Ассоциация Полиморфных Маркеров Leu28pro Гена Арое И Pro12ala Гена Pparg2 При Диабетической Нефропатии У Больных Сд 2 Типа. Central Asian Journal of Medical and Natural Science, 4(1), 146-152.
10. Султонов, П. И., Умарова, З. Ф., Жаббаров, О. О., Ходжанова, Ш. И., Кодирова, Ш. А., Жуманазаров, С. Б., & Рахматов, А. М. (2023). Антиагрегант Терапияни Сурункали Буйрак Касаллигига Буйрак Функционал Захирасига Таъсири.
11. Косимбаев, С., Аляви, А., Турсунова, Л., & Жуманазаров, С. (2021). АГРЕГАТНОЕ СОСТОЯНИЕ КРОВИ И КОАГУЛЯЦИОННЫЙ ГЕМОСТАЗ У БОЛЬНЫХ С ИШЕМИЧЕСКИЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19.
12. Жаббаров, А. А., Аминова, Г. А., Мамбетова, Д. К., Сайдалиев, Р. С., Максудова, М. Х., Турсунова, Л. Д., ... & Надирова, Ю. И. (2023). ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПИИ КАРДИОРЕНАЛЬНОГО СИНДРОМА У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТЬЮ. Models and methods in modern science, 2(2), 83-84.
13. Rakhmatov, A. M., Jabbarov, A. A., Kodirova, S. A., & Jumanazarov, S. B. (2022). CLINICAL MANIFESTATIONS OF GOUTHY NEPHROPATHY (Doctoral dissertation, THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES: 1 pp. 140-141 (6).).
14. Рахматов, А., Жаббаров, О., Қодирова, Ш., Жуманазаров, С., Мирзаева, Г., & Тожибоев, М. С. (2022). Подаграда буйраклар заарланишининг клиник ва генетик хусусиятлари.
15. Sultonov, P. I., Umarova, Z. F., Jabbarov, O. O., Khodjanova, S. I., Jumanazarov, S. B., Rahmatov, A. M., & Rahimov, I. S. (2023). EFFECT OF ARTIAGREGANT THERAPY ON KIDNEY FUNCTIONAL RESOURCES IN CHRONIC DISEASE. Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences, 2(5), 137-138.
16. Кодирова, Ш. А., & Ходжанова, Ш. И. (2022). ВАЖНОСТЬ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ (Doctoral dissertation, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ СИМУЛЯЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ).



THEORETICAL ASPECTS IN THE FORMATION OF PEDAGOGICAL SCIENCES

International scientific-online conference



17. Камилова, У. К., & Кадырова, Ш. (2016). Изучение психологического состояния у больных с хронической сердечной недостаточностью. Евразийский кардиологический журнал, (3), 82-83.
18. Реймбаева, А. А., Аляви, А. Л., Ходжанова, Ш. И., Жаббаров, А. А., Сайдалиев, Р. С., Кодирова, Ш. А., & Максудова, М. Х. (2023). Особенности Течения Хронической Сердечной Недостаточности, Резистентной К Антиагрегантной Терапии.
19. Каримов, А. А., Сайдалиев, Р. С., & Надирова, Ю. И. (2020). ВЛИЯНИЯ ПРИМЕНЕНИЯ САКУБИТРИЛ/ВАЛСАРТАН У БОЛЬНЫХ ХСН. In ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ (pp. 14-18).

