




СБОРНИК ТЕЗИСОВ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

XXI ВЕК: СОВРЕМЕННЫЙ
ВЗГЛЯД НА ПСИХИЧЕСКОЕ
ЗДОРОВЬЕ



ISBN 978-9943-9403-6-9



9 789943 940369

ТАШКЕНТ

**МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ТАШКЕНТСКИЙ ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ
ИНСТИТУТ**

АССОЦИАЦИЯ ПСИХИАТРОВ УЗБЕКИСТАНА

СБОРНИК ТЕЗИСОВ

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ

**XXI ВЕК: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - III**

*Сборник посвящен памяти учителя, доктора медицинских наук,
профессора Исмаилова Турсун Исмаиловича*

20 апреля 2023

ТАШКЕНТ

УДК: 616.89(082)

ББК 89.4я

Д 22

XXI век: Современный взгляд на психическое здоровье - III. Сборник тезисов научно-практической онлайн-конференции. –Т.: «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2023. 440 с.

ISBN 978-9943-9403-6-9

Нарушения психического здоровья – это собирательное понятие, охватывающее психические расстройства, различные виды психосоциальной инвалидности, а также прочие психические патологические состояния, сопряженные со значительным дистрессом, функциональными нарушениями или риском самоповреждения. Как правило, лица с нарушениями психического здоровья чаще испытывают более низкий уровень психического благополучия, хотя возможны и исключения.

Коллектив кафедры Психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии и психотерапии Ташкентского педиатрического медицинского института организовала данную конференцию в продолжение цикла проводимых онлайн-конференций «XXI век: современный взгляд на психическое здоровье - III», посвященный 90-летию прекрасного ученого и наставника, профессора Турсун Исмаиловича Исмаилова.

В сборнике тезисов конференции будут освещены актуальные вопросы эпидемиологии и диагностики психических и поведенческих расстройств, вопросы клинической психологии, обсужден современный взгляд на вопросы терапии, прогноза и профилактики психических заболеваний и аддикций.

Коллектив авторов: сотрудники кафедры - Абдуллаева В.К., Сулейманов Ш.Р., Шарипова Ф.К., Бабарахимова С.Б., Рустамова Ж.Т., Ганиханов А.А., Нурходжаев С.Н., Насыров А.А., Туйчиев Ш.Т., Саттаров Т.Ф., Матвеева А.А., Рогов А.В., Мухтаров Б.А., Ирмухамедов Т.Б., Султанова К.Б., Алиев Б.А.

Рецензенты:

Султанов Ш.Х. – руководитель 3-го терапевтического направления Ташкентского государственного стоматологического института, д.м.н., доцент;

Ходжаева Н.И. – профессор кафедры Психиатрии, наркологии и детской психиатрии, медицинской психологии и психологии Ташкентского педиатрического медицинского института

ISBN 978-9943-9403-6-9

© «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi», 2023.

Вывод. Когнитивные расстройства при эпилепсии являются одним из важнейших компонентов клинической картины заболевания, существенно влияющих на качество жизни и социальную адаптацию пациентов. В связи с расширением представлений о комплексном негативном влиянии когнитивных расстройств на качество жизни больных эпилепсией, в настоящее время качество жизни признана важным компонентом программы лечения больных эпилепсией.

ОЦЕНКА КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ С УЧЕТОМ ДИНАМИКИ КЛИНИКО-СОЦИОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ШИЗОФРЕНИИ

Кучкаров У.И., Ходжаева Н.И.
Бухарский государственный
медицинский институт, г.Бухара
www.KuchkarovU76@mail.ru

Актуальность. Охрана психического здоровья населения находится в центре внимания ученых всего мира и является одним из приоритетных направлений здравоохранения Республики Узбекистан. Авторами показана высокая распространенность когнитивных нарушений у больных шизофренией. Когнитивный дефицит наряду с продуктивной и негативной симптоматикой рассматривается как третья ключевая группа симптомов при шизофрении. При этом отмечается, что когнитивные нарушения являются сильным предиктором неблагоприятного социального и трудового исхода заболевания. Когнитивные функции являются важными индикаторами состояния у больных шизофренией и определяют социальный прогноз заболевания, степень трудовой и социальной дезадаптации больных. В последнее время в отечественных и зарубежных исследованиях возрастает интерес к более глубокому и детальному изучению нейрокогнитивного дефицита при шизофрении.

Цель и задачи исследования. Определить особенности когнитивных расстройств и разработать современные методы лечения больных шизофренией. Изучение социальных факторов и их значимости в оценке когнитивных расстройств. Обосновать корреляционную взаимосвязь социальных факторов в диагностике и степени

тяжести когнитивных расстройств. Разработать новые направления дифференцированной терапии и тактики при различных проявлениях когнитивных расстройств с учетом динамики клинико-социологических параметров заболевания. На основе полученных результатов разработать алгоритм диагностики и лечения.

Материалы и методы исследования. В исследование было включено 199 больных, 106 мужчин (53,3%) и 93 женщин (46,7%). Возраст больных составлял от 30 до 50 лет (в среднем $42,5 \pm 8,3$ лет); длительность заболевания - $5,7 \pm 2,2$ года, которые соответствовали диагностическим критериям МКБ-10 для шизофрении. Когнитивная функция у больных оценивалась Монреальской шкалой который состоит из 15 подтверждений. На каждого больного заполнялась анкета с включением социально-демографических показателей (пол, возраст, место жительства, образование, семейный статус, занятость/инвалидность), клинические характеристики. В браке состояли 52 пациента (26,1%), 27 человек (13,5%) были разведены, а остальные 120 чел. (60,3%) -никогда не были замужем или женаты. Большинство пациентов - 84 чел. (42,2%) имели среднее специальное образование, высшее образование получили 24 чел. (12,1%), незаконченное высшее - 17 чел. (8,5%), среднее - 49 чел. (24,6%); незаконченное среднее - 25 чел. (12,6%). На момент обследования работали 44 чел. (22,1%), остальные 86 чел. (43,2%) не работали и не учились, причем 69 чел. (34,7%) уже на этом этапе заболевания имели группу инвалидности по психическому заболеванию.

Результаты исследования. Диагноз больных установлен согласно МКБ-10 Шизофрения непрерывная, шизофрения эпизодическая с нарастающим дефектом, шизофрения эпизодическая со стабильным дефектом. Больные разделены на 3 группы. В основной группе больным назначено АН (рисперидон, кетилепт, оланзапин)+ноотропы (Бролизеф), в контрольной группе назначено отечественные нейролептики+ноотропы. Когнитивные функции были оценены в начале в конце курса лечения. Динамика состояния когнитивных функций, оцениваемых по выполнению больными ряда тестов, показала улучшение в процессе терапии в обеих группах. Изменения суммарной среднегрупповой оценки по шкале MMSE оказались достоверными в контрольной группе к окончанию по сравнению с исходной оценкой, в основной группе достоверное

<i>Irmukhamedov T.B., Rakhmatjonova R.R., Ibrahimov Sh. F., Botirov I., Kolotilo K. S.</i> Clinical aspects of cognitive functioning in children with autism spectrum disorder.....	149
<i>Искандарова Ж.М.</i> Принципы лечения больных параноидной шизофренией с учётом гендерных особенностей.....	150
<i>Исканжанова Н. И., Бабарахимова С. Б.</i> Роль семьи в формировании интернет-аддикции.....	155
<i>А. В. Карлова, З.Т. Гусейнова, И.С. Ляпунов, С.И. Ляпунов, М.В. Иванов, И.И. Шошина.</i> Контрастная чувствительность и глазной микротремор в норме и при шизофрении с галлюцинаторной и бредовой симптоматикой	160
<i>Р.В. Кашавкин, Д.В. Труевцев, Е.В. Гуткевич.</i> Импульсивность в контексте перехода от суицидальных мыслей к суицидальному поведению.....	162
<i>Кдрыбаева Ф.Р.</i> Оценка распространенности стоматологических заболеваний у детей в разные периоды жизни.....	167
<i>Кенжаева Н.К., Хусанов И.Я., Кенжаева Д.К.</i> Умумтаълим мактабларининг юқори 9-11 синф ўқувчилари билан “музокаралар майдончалари” ни ўтказиш.....	168
<i>Кимсанбоева О. К. Рогов А.В.</i> Психопатологический профиль аффективных расстройств у больных параноидной шизофренией, ассоциированной со стрессом.....	170
<i>Козлов М.Ю., Иваницкая Е.Д.</i> Связь нарушенного типа привязанности, «большой пятерки» и психологического благополучия у пациентов с депрессивным эпизодом.....	172
<i>Kopzhasarova K.A., Burhina M.P., Zhumabaikyzy A., Janahmet J.A., Omirali A., Seidazimov E., Dakenova A.</i> Approaches to the therapy of schizophrenia in the conditions of psychiatric hospital of a specialized type with intensive observation.....	175
<i>Копжасарова К.А., Бурхина М.П., Жұмабайқызы А., Жанахмет Ж.А., Омирали А., Сейдазимов Е., Дакенова А.</i> Подходы к терапии шизофрении в условиях психиатрической больницы специализированного типа с интенсивным наблюдением	179
<i>Королева П.В.</i> Особенности несуицидальных самоповреждений у подростков.....	184
<i>Кудряшов М.А.</i> Торонтская шкала алекситимии: обзор актуальных вопросов.....	186
<i>Kurbaniyazova Sh.E., Babayev J.S., Uralova D.A., Gopurova G.F.</i> Ayollar alkogolizmining gender xususiyatlari.....	189
<i>Кучкаров У.И., Илёсов Б.У., Ашурова Р.Р.</i> Взаимосвязь когнитивных расстройств и качества жизни при эпилепсии.....	191
<i>Кучкаров У.И., Ходжаева Н.И.</i> Оценка когнитивных расстройств с учетом динамики клинико-социологических параметров шизофрении.	193

**СБОРНИК ТЕЗИСОВ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ**

**XXI ВЕК: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА
ПСИХИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ - III**

*Сборник посвящен памяти учителя, доктора медицинских наук,
профессора Исмаилова Турсун Исмаиловича*

Ташкент – «Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi» – 2023

Редактор: Ш.Кушербаева
Дизайнер: У.Ортиков
Компьютерная
вёрстка: Ш.Миркасимова



E-mail: tipografiyacnt@mail.ru Тел: 97-450-11-14, 93-381-22-07.

Разрешено в печать 17.04.2023.

Формат 60x84 ¹/₁₆. Гарнитура «Times New Roman».

Офсетная печать. Усл. печ.л. 27,75. Изд. печ.л. 27, 5.

Тираж 100. Заказ № 30.

**Отпечатано в типографии
«Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi»
г. Ташкент, ул. Фозилтепа, 22 б.**