



TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI
TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ТАШКЕНТСКАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ

MINISTRY OF HEALTH OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
TASHKENT MEDICAL ACADEMY

«KLINIK FARMAKOLOGIYA: ZAMONAVIY
FARMAKOTERAPIYA MUAMMOLARI» XALQARO ILMIY-
AMALIY ANJUMANI
TEZISLAR TO'PLAMI

СБОРНИК ТЕЗИСОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ «КЛИНИЧЕСКАЯ ФАРМАКОЛОГИЯ:
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ФАРМАКОТЕРАПИИ»

COLLECTION OF ABSTRACTS
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL
CONFERENCE

« CLINICAL PHARMACOLOGY: PROBLEMS OF MODERN
PHARMACOTHERAPY»

Toshkent 2023 yil 27 aprel

KLINIK FARMAKOLOGIYA: ZAMONAVIY FARMAKOTERAPIYA MUAMMOLARI: Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani tezislar to'plami (Toshkent, 2023 yil 27 фзкуд) / Bosh muharrir Shadmanov A.K. - Toshkent: TTA, 2023.

Toshkent tibbiyot akademiyasida bo'lib o'tgan «Klinik farmakologiya: zamonaviy farmakoterapiya muammolari» xalqaro ilmiy -amaliy anjumanida taqdim etilgan tezislar ushbu to'plamdan o'rin olgan.

To'planning asosiy qismi farmakoterapiyaning dolzarb muammolarini aks ettiradi: ichki a'zolar kasalliklarini davolash va oldini olishning samarali usullarini ishlab chiqish va tadbir etishga bag'ishlangan.

Taqdim etilgan ilmiy natijalar terapiya yo'nalishining barcha mutaxassislari uchun ilmiy va amaliy ahamiyatga ega. Tezislarning mazmuni, ulardagi xatoliklar va statistik ma'lumotlarning haqqoniyligi uchun mas'uliyat mualliflar zimmasidadir.

Bosh muharrir

Shadmanov Alisher Kayumovich
tibbiyot fanlari doktori, professor

Bosh muharrir o'rinbosari

Yakubov Abdusalol Vaxabovich
tibbiyot fanlari doktori, professor

Muharrirlar jamoasi

Zufarov Pulat Saatovich
tibbiyot fanlari doktori, professor

Akbarova Dilfuza Suratovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Pulatova Durdona Baxadirovna
tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Pulatova Nargiza Ixсанovna
tibbiyot fanlari doktori, dotsent

Saidova Shaxnoza Aripovna
tibbiyot fanlari nomzodi, katta o'qituvchi

Musayeva Lola Jurayevna
tibbiyot fanlari nomzodi, katta o'qituvchi

Abdusamatova Dilorom Ziyaviddinovna
tibbiyot fanlari nomzodi, katta o'qituvchi

Цель исследования. Изучить состояние вен нижних конечностей у больных с остеоартритом коленных суставов, а также спектра лечебных методов, применяемых у больных с сочетанной патологией (хроническая венозная недостаточность и остеоартрит коленных суставов) в амбулаторной практике.

Методы исследования. Исследование проведено на базе РСНПМЦТ и МР на период от 2021-2022 гг. Материалом исследования послужили всего 30 больных мужского и женского пола с признаками хронической венозной недостаточности и остеоартрита коленного сустава в возрасте от 50 до 75 лет, принимающих регулярное амбулаторное лечение по поводу гонартроза. Диагноз остеоартрита коленных суставов был выставлен пациентам ранее. Исследование коленного сустава проводилось по стандартной методике. При оценке результатов исследования принимались рентгенологические критерии артроза Kellgren-Lawrence. Для определения наличия хронической венозной недостаточности всем пациентам было выполнено дуплексное сканирование вен нижних конечностей с обязательной оценкой наличия поражения глубоких вен, состояния клапанной системы, наличия несостоятельных вен перфорантов. Исследования проводились по стандартной методике в положении лёжа и стоя, с выполнением функциональных проб. Дуплексное сканирование вен нижних конечностей проводили на аппарате Acuson X300 компании Siemens. Степень выраженности ХВН оценивалась по шкале CEAP, выраженность проявлений гонартроза – по функциональному индексу WOMAC, ВАШ оценивалась потребность в нестероидных противовоспалительных препаратах. Результаты обработаны с помощью программы Microsoft Excel 2003.

Результаты. Из 30 пациентов с гонартрозом у 25 (83%) больных было наличие патологии вен нижних конечностей. Из них у 18 пациентов была выявлена варикозная болезнь (из них у 4 пациентов впервые выявленная варикозная болезнь), а у 7 пациентов посттромбофлебитический синдром. Это позволяет сделать вывод, что более чем у половины пациентов, страдающих остеоартритом коленного сустава, встречается хроническая венозная недостаточность нижних конечностей, несмотря на регулярное прохождение курса лечения ими, что говорит о высокой частоте сочетания данных патологий. У остальных 5 пациентов (7%), страдающих гонартрозом, не удалось выявить явных отклонений от нормы в венозной системе нижних конечностей.

Вывод. Таким образом, было выявлено, что гонартроз и хроническая венозная недостаточность чаще имеет сочетанный характер течения. При исследовании вен нижних конечностей у больных с остеоартритом коленного сустава, получающих регулярное лечение хондропротекторами и НПВС, у более половины исследуемых встречается хроническая венозная недостаточность.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫЙ ФИТО КОМПЛЕКСА В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ ХОЛЕРЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ ОСТРОМ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ.

Хакимов З.З., Мустанов Т.Б.

Кафедра Фармакологии ТМА, EMU UNIVERSITY

Актуальность: Несмотря на значительные достижения достигнуты в лечение гепатитов различной этиологии восстановления функциональной активности печени остаётся важной проблемой гепатологии. В этом плане представляется важным создание новых средств лечения из многокомпонентных лекарственных сборов, так как содержащиеся в них различные биологические соединения оказывают влияние на различные звенья патогенеза поражений органов и систем. Более того фитопрепараты наряду с тем, что обладают высокой активностью являются малотоксичными соединениями.

Цель: Исследование влияния нового фито комплекса на холеретическую функцию печени при остром токсическом гепатите.

Материалы методы: Эксперименты проведены на половозрелых белых крысах самцах. Массой тела 200-240 г. Острый токсический гепатит воспроизводили путём

парентерального введения CsCl_4 . В дозе 0,2 мл на 100г в виде 50% маслянного раствора. Лекарственный сбор состоящий из травы медиазии крупно листной, зверобоя продыравленного, травы зизифоры и корня солодки вводили внутрь в дозе 50 мг/кг в течение 6 дней. О функциональном состоянии печени судили по количеству выделенной желочи, по активности Ал АТ в сыворотки крови и содержания гликогена в печени.

Результаты и обсуждения: Анализ полученных экспериментальных данных показали что у опытных крыс по сравнению с здоровыми количество желчи выделенной в течение четырёх часов эксперимента снижалось 2,44 раза, активность Ал АТ повышалось в 3,9 раза, а содержание гликогена снижалось 1,91 раза. В отличие от этого у крыс лечённых новой фитокомпазией отмечалось существенное восстановление функционального состояния печени. Так, объём выделенной желчи увеличивалась почти два раза, активность Ал АТ снижалось на 53%, а содержание гликогена увеличивалось на 86%, что указывает на отчетливый фармакотерапевтический эффект исследованного лекарственного сбора. Примечательно, что полученные результаты показали более высокую фармакологическую активность последнего по сравнению с ЛИФ-52. Механизм лечебного эффекта исследованного фитосбора вероятно связан с его антиоксидантными свойствами, ибо в указанных растения содержится флавоноиды обладающий этим свойством. Учитывая низкую токсичность исследованного фитосбора и его существенный лечебный эффект можно полагать, что данный сбор может быть подвергнут дополнительным целенаправленным фармакологическим, биохимическим и морфологическим исследованиям в плане создания нового эффективного средства лечения острых гепатитов.

Выводы:

1. При остром токсичном гепатите холеретическая функция печени значительно снижается.
2. Лечебное применение нового фитосбора устраняет явления цитолиза при остром гепатите индуцированного тетрахлорметаном.
3. Новый фитосбор стимулирует гликоген образовательную функцию печени.

РЕАКТИВ АРТРИТДА БЎҒИМ СИНДРОМИНИ ЭРТА ДАВОЛАШНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ

Халметова Ф.И., Ахмедов Х.С.

Тошкент тиббиёт академияси, Тошкент, Ўзбекистон

Маълумки, реактив артрит (РеА) эпидемиологияси ҳақида аниқ маълумотлар йўқ ва бу илгари кам яққолликда намоён бўлган инфекцияларни қиёслаш қийинлиги, шунингдек бошқа артритлар билан клиник белгиларининг ўхшашлиги билан изоҳланади.

Тадқиқот мақсади: РеАга чалинган беморларда тоғай олигомер матрикс оксиди (СОМР) миқдорига кўра қаратилган даволашнинг шу касалликни ўзига хос клиник кечишини аниқлашдан иборат.

Тадқиқот манбалари ва усуллари: Тадқиқотга 19-50 ($35,6 \pm 10,3$) ёшдаги, касаллик давомийлиги $3,1 \pm 1,4$ йилни ташкил қилган. Урогенитал этиологияли РеАга чалинган 50 нафар беморлар жалб қилинган. Текширувни амалга ошириш учун даволаш тактикасига кўра беморлар иккита гуруҳга тақсимланган. Назорат гуруҳига ($n=25$) базис даво, яъни анъанавий усул ёрдамида даволанган беморлар киритилди. Асосий гуруҳни ($n=25$) базис даво билан биргаликда, шикастланган бўғимларда эрта деструкцияланишни даволашга қаратилган усул қўлланилган беморлар ташкил қилган.

Тадқиқот натижалари: Тадқиқотга жалб қилинган беморлар аёллар 58% ни ташкил қилган. Анамнездаги маълумотларга кўра, РеАнинг илк белгилари пайдо бўлганда беморларнинг ўртача ёши $30,1 \pm 5,3$ ни ташкил қилган. Белгиларнинг пайдо бўлиши билан РеА ташҳис қўйилгунга қадар бўлган ўртача давр 2,5 ойдан иборат бўлган. Бўғимлар функционал ҳолатининг бузилишларини бўғимдаги яллиғланиш жараёнидаги ўзига хос ўзгаришлар билан боғлаш мумкин. Беморларида аниқланган яллиғланишнинг ўткир фаза

**BOSH MIYYA JAROHATI BO'LGAN BEMORLARDA GIPEROSMALYAR
TERAPIYANING ZAMONAVIY TAMOIYILLARI**

Fozilov U.N. Krasnenkova M.B. Sharopov M.M.102

**ИЗУЧЕНИЕ СОСТОЯНИЯ ВЕНОЗНОЙ СИСТЕМЫ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ У
БОЛЬНЫХ С ГОНАРТРОЗОМ, ПРИНИМАЮЩИХ ХОНДРОПРОТЕКТОРЫ И
НПВС.**

Хаджиматова И.Х., Азимова М.М., Эшмурзаева А.А.103

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ НОВЫЙ ФИТО КОМПЛЕКСА В КОРРЕКЦИИ НАРУШЕНИЙ
ХОЛЕРЕТИЧЕСКОЙ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ ПРИ ОСТРОМ ТОКСИЧЕСКОМ
ГЕПАТИТЕ.**

Хакимов З.З., Мустанов Т.Б.104

**РЕАКТИВ АРТРИТДА БЎҒИМ СИНДРОМИНИ ЭРТА ДАВОЛАШНИНГ ЎЗИГА
ХОСЛИГИ**

Халметова Ф.И., Ахмедов Х.С.105

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА ПАНТОГАМ В КОРРЕКЦИИ
КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ У ДЕТЕЙ**

Хамитхожаева Х.А., Гулямова М.К.106

**ОНКОЛОГИЯ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ВЗГЛЯД СО СТОРОНЫ
КАРДИОТОКСИЧНОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ МОНОКЛОНАЛЬНЫХ АНТИТЕЛ**

Хлямов С.В., Маль Г.С., Артюшкова Е.Б.107

**ЭФФЕКТИВНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИНГИБИТОРОВ
ПРОТОННОЙ ПОМПЫ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ**

Цепелева С.А., Цепелев В.Ю.108

**ПРИМЕНЕНИЕ ИНГИБИТОРОВ АНГИОТЕНЗИНПРЕВРАЩАЮЩЕГО
ФЕРМЕНТА ПРИ ЛЕЧЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ**

Чебатурса О. Ю.109

**QANDLI DIABETNING 2-TURINI BIGUANID GURUH PREPARATLARI BILAN
DAVOLASHDA MIKROBIOTA HOLATINING O'ZGARISHI**

Shagzatova B.X., Vafoyev Sh.F.110

**OPERATSIYADAN KEYINGI OG'RIQNI YENGILLASHTIRISH UCHUN
INFLYUGANNING XAVFSIZLIGI VA SAMARADORLIGI**

Sharopov M.M. Krasnenkova M.B., Fozilov U.N.110

**OG'IR STROMAL HERPETIK KERATITNI
DAVOLASHDA OFTALMOFERONNING QIYOSIY SAMARADORLIGI**

Shofotixov A.F., Shukurov B.M.111