



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
SOG'LIQNI SAQLASH VAZIRLIGI



TOSHKENT TIBBIYOT
AKADEMIYASI

ENDOKRINOLOGIYANING DOLZARB MUAMMOLARI:

Xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari

TO'PLAMI

Toshkent - 2023

ҚАНДЛИ ДИАБЕТ 2 ТИПДА ДИАБЕТИК ЭНЦЕФАЛОПАТИЯНИНГ КЛИНИК АСПЕКТЛАРИ

Шагазатова Б.Х, Кенжаева Ю.Р., Кенжаев Ф.Х.

Тошкент Тиббиёт Академияси

Мақсад: Қанли диабет 2 тип беморларда диабетик энцефалопатиянинг клиник аспектларини ўрганиш.

Материал ва усуллар: Текширувга Тошкент Тиббиёт Академияси 2 клиникаси Эндокринология бўлимида стационар даво олган қандли диабет 2 турли 26 та бемор олинди. Беморлар ўртача ёши $57,2 \pm 2,09$, касаллик давомийлиги $9.38 \pm 1,23$ йил. Углевод алмашинувини текшириш учун барча беморларда наҳорги ва овқатдан кейинги қондаги глюкоза, гликирланган гемоглобин аниқланди. Диабетик энцефалопатия клиник белгиларини аниқлаш учун беморларда ЭЭГ, Допплерография, MMSE (Mini-Mental Scale Examination) сўровномаси ва неврологик кўрик ўтказилди.

Текширув натижалари: Углевод алмашинувини аниқлаганда барча беморларда ўртача наҳорга 10.6 ммоль/л, 2 соатдан кейин 13.22 ммоль/л, гликирланган гемоглобин ўртача 7.9% эканлигини кўрсатди. Тана вазни индекси ўртача 30.94 ± 0.68 га тенг. Беморлар ҳаёти давомида кузатилган гипо холатлар сони ойига ўртача 2.0 ± 0.066 га тенглиги аниқланди. Когнитив бузилишлар ва деменция кўрсаткичлари MMSE сўровномаси натижаларига кўра ўртача 26.47 ± 0.80 баллни ташкил этди. Ундан 13(50%) беморда 30 балл(III даража), 8(30%) беморда 26 балл(II) даража, 5(20%) беморда 22 балл (I) даража дисциркулятор энцефалопатия аниқланди. 13(50%) та беморда ЭЭГ текшируви ўтказилди; улардан 10(80%) та беморда бош мия ичи гипертензияси, 3(10%) та беморда норма кўрсаткичлари аниқланди. Бош мия қон томирлар Допплерографияси 13(50%) та беморда ўтказилди. Уларнинг ҳаммасида уйқу артериялари (a.carotis) атеросклерози аниқланди. Неврологик кўрик ўтказилганда 26(100%) беморларда дисциркулятор энцефалопатия белгилари аниқланди.

Хулоса: Натижалар шуни кўрсатдики, қандли диабет 2 тур беморларда MMSE (Mini-Mental Scale Examination) сўровномасига кўра дисциркулятор энцефалопатия 13(50%) беморда 30 балл(III даража), 8(30%) беморда 26 балл(II) даража, 5(20%) беморда 22 балл (I) даража аниқланди. ЭЭГ текширувига кўра 10(80%) та беморда бош мия ичи гипертензияси аниқланди. Бош мия қон томирлар Допплерографияси 13(50%) та беморда уйқу артериялари (a.carotis) атеросклерози аниқланди.