



## **СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ**

77-Й МЕЖДУНАРОДНОЙ НАУЧНО-  
ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

**«Достижения фундаментальной,  
прикладной медицины и фармации»**

ПОД РЕДАКЦИЕЙ  
ПРОФЕССОРА РИЗАЕВА Ж.А.

**САМАРКАНД 2023**

Перкутанный остеосинтез при лечении юношеского эпифизеолиза головки бедренной кости у детей <i>Нуралиев Азимжон Мансурович</i>	399
Анализ частоты выявляемости субдуральных и эпидуральных гематом головного мозга <i>Нуралиев Ахрорбек Аззамжон угли, Абдувойитов Бобур Бахдирович, Холмуродова Хулкар Холиёровна</i>	400
Изучения связи онкогена tp53 с полиморфизмом pro72arg при хмпз с рh (-) у больных с истинной полицитемией <i>Омонов Мадорбек Ойбек угли</i>	400
Успешное проведение первого этапа радикального оперативного лечения у пациентки с метастатическим раком сигмовидной кишки, осложненным толстокишечным свищем, флегмоной передней брюшной стенки после 1-й линии полихимиотерапии: клинический случай <i>Петрова Полина Юрьевна</i>	401
Изучение роли компьютерной томографии в выявлении аномалии киммерли у взрослых <i>Рахматова Ирода Бахтиёровна</i>	402
Влияние метаболитов различных штаммов фекального энтерококка на пролиферацию клеток колоректального рака <i>Рохмистрова В.М., Пряжникова М.И.</i>	402
Результаты тотального эндопротезирования тазобедренного сустава у больных с последствиями туберкулезного коксита <i>Рустамов Фаррух Халмуминович</i>	403
Предоперационная подготовка и эндопротезирования тазобедренного сустава у больных с туберкулезном кокситом <i>Рустамов Фаррух Халмуминович</i>	403
Сакральные дефекты позвоночника и их дифференциальная диагностика <i>Саидмуродов Махмудали Суратзода</i>	404
Анализ данных регистра руз опухолей гипоталамо-гипофизарной системы по пациентам с акромегалией <i>Саломова Фарзона Фарруховна</i>	404
Уз-диагностика респираторного дистресс-синдрома у детей недоношенного возраста <i>Салохий Икболбегим Отабековна</i>	405
Особенности рецепторного аппарата кровяных телец больных лимфолейкозом <i>Сатторов Хожимурод Абдурашидович, Тошмуродов Сундур Каримжонович, Холлиев Тулкин Тоштемирович</i>	405
Оценка энергетического метаболизма клеток колоректального рака in vitro, in vivo, ex vivo методом flim <i>Синюшкина Снежана Дмитриевна, Омарова Анастасия Денисовна, Дружкова Ирина Николаевна</i>	406
Клиническое исследование состояния межпозвоночных дисков у пациентов после операций на позвоночнике: результаты и перспективы <i>Султанова Дильшода Мамраим кизи, Холмуродов Одилбек Холиёрович, Холмуродова Хулкар Холиёровна</i>	406
Эффективность «плазмолифтинга» в лечении деформирующих артрозов <i>Тураев Ш.М.</i>	407
Эффективность перкутанной кифопластики и вертебропластики при патологиях позвоночника <i>Турсунов Жахонгир, Хамидова Икбол, Холмуродова Хулкар</i>	407
Диагностические особенности видеоторакокопии при травмах груди <i>Убайдуллаева Муборакхон Асомиддин кизи</i>	408
Двусторонний рак молочной железы: значение клиничко-морфологических и иммуногистохимических характеристик в определении эффективности лечения <i>Улмасов Фирдавс Гайратович, Ходжиева Камилла Ферузовна</i>	408
Прогностические факторы при раке яичников <i>Умарзода С.Г., Носирова Ф.Т.</i>	408
Морфологические критерии рака предстательной железы <i>Уракова Гулчирой Мансуровна, Кудратова Мохинур Махмудовна</i>	409

ностях было в сразу же в первые 2 часа после операции.

**Выводы:** Таким образом, согласно анализам результатов исследования, можно сделать вывод, что положительный результат после проведения чрез кожные вертебропластики и кифопластики (отсутствие боли,

стабилизация тел позвонков, активизация больных) уже через несколько часов после их выполнения наблюдается в 95-99% случаев, с учётом тяжести клиники и уровня поражения позвонка.

## ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВИДЕОТОРАКОСКОПИИ ПРИ ТРАВМАХ ГРУДИ

Убайдуллаева Муборакхон Асомиддин кизи

Научный руководитель: д.м.н. Шарипов А.М.

Ташкентский Педиатрический Медицинский Институт, Ташкент, Узбекистан

**Цели исследования:** Улучшение результатов лечения травм груди с использованием диагностических возможностей видеоторакоскопии.

**Материалы и методы.** Для работы были отобраны результаты обследования и хирургического лечения 64 пострадавших с закрытыми травмами груди и ранением груди в возрасте до 18 лет, находившихся на лечении в отделении экстренной хирургии ГКБ№4 за период с октября 2021 по февраль 2023 г. Больные были разделены на 2 группы: I- группу составили 25 (40%) больных, обследование и лечение которых проводилось без применения видеоторакоскопии. II-группу составили 39 (60%) пациентов, у которых для диагностики и хирургического лечения была использована видеоторакоскопия.

**Результаты и их обсуждение.** Нами было установлено что видеоторакоскопия имеет ряд преимуществ при диагностике закрытых травм груди и травматического гемоторакса. В дополнение к высокой диагностической эффективности видеоторакоскопии, метод отличается еще и достаточно широкими лечебными возможностями. Анализируя результаты лечения во II группе, становится очевидным, что применение экстренной видеоторакоско-

пии позволило провести полноценную ревизию органов грудной полости, диагностировать анатомические повреждения в раннем периоде после травмы и избежать широкой торакотомии у 8 (26%) пациентов.

**Выводы.** Из всех методов диагностики травм груди наилучшие показатели специфичности, чувствительности и общей точности показала видеоторакоскопия, которая позволяет провести полноценную ревизию и диагностику с оценкой объема и характера повреждений органов грудной полости и средостения. При применении ВТС на инициальном этапе диагностики позволяет оценить объем и характер ТГ, выбрать оптимальную тактику хирургического лечения, способствует ранней активизации пострадавших, снижает частоту послеоперационных осложнений с 25,4% до 10,9%, сокращает сроки лечения с  $8,1 \pm 0,36$  до  $7,1 \pm 0,27$  койко-дня.

Хирургическую тактику лечения повреждений груди необходимо определять не по результатам предварительного дренирования плевральной полости, а по результатам видеоторакоскопической ревизии и с учетом лечебных возможностей видеотендоскопической техники.

## ДВУСТОРОННИЙ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ: ЗНАЧЕНИЕ КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИХ И ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК В ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ

Улмасов Фирдавс Гайратович, Ходжиева Камилла Ферузевна

Научный руководитель: Каримова М.Н.

Самаркандский Государственный Медицинский Университет, Самарканд, Узбекистан

**Цель работы:** Повышение эффективности двустороннего лечения рака молочной железы.

**Материалы и методы исследования:** Исследование основано на изучении анамнеза и данных амбулаторных карт 68 больных, находившихся на лечении под контролем по поводу «Двусторонний метастатический рак молочной железы» в Самаркандском филиале Республиканского специализированного онкологического и радиологического центра научного и практической медицины с 2015 по 2022 год.

**Результаты исследования:** Все пациенты получали лечение по стандартным методикам. Исходы лечения определяли по показателям 5- и 10-летней выживаемости. В исследовании выживаемость определялась на основании 8 критериев, определяющих выживаемость: исходя из интервала между первичной и метастатической опухолью, возраста больного, размера опухоли, репродуктивного статуса, гистологического типа опухоли, рецептора стероидных гормонов, метода лечения. видно, что чем больше

интервал между первичной и метастатической опухолью, тем дольше выживаемость больных. Пациенты в исследовании также показали, что пациенты с метастатическими опухолями, появившимися через 5 лет, жили до 10 лет. Этот показатель является самым основным показателем, а это означает, что отдаленная выживаемость больных зависит в первую очередь от продолжительности периода между первичными и метастатическими опухолями.

**Выводы:** При многих метастатических первичных рака они являются основными признаками, определяющими риск и исход заболевания; время появления второй опухоли, возраст пациента, репродуктивный статус, размер опухоли, поражение регионарных лимфатических узлов, уровни рецепторов стероидных гормонов, режим лечения и гистология опухоли. При первичных и метастатических опухолях чаще наблюдается дольковый гистологический тип опухоли, в нашем исследовании он составляет 62%, что свидетельствует о значительно более легком течении метастатического рака молочной железы.

## ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПРИ РАКЕ ЯИЧНИКОВ

Умарзода С.Г., Носирова Ф.Т.

ГОУ «Таджикский государственный медицинский университет имени Абуали ибн-Сино»

**Цель исследования.** Изучить факторы прогноза, влияющие на исход и выживаемость больных РЯ.

**Материал и методы.** 238 больных с морфологически

подтвержденным диагнозом РЯ, получивших лечение за 2010-2018гг. в ГУ «Республиканский онкологический научный центр» МЗСЗН РТ.