



TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASIGA 100 YIL



**TOSHKENT TIBBIYOT
AKADEMIYASIGA 100
YIL**

Toshkent tibbiyot akademiyasi tashkil etilganining
100 yilligiga bag'ishlangan

**“Toshkent tibbiyot akademiyasiga 100 yil – buyuk ishlar va yangi
kashfiyotlar davri”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjumani materiallari to'plami

Сборник материалов научно-практической конференции с международным
участием, посвященной 100-летию Ташкентской медицинской академии,
**«100 лет Ташкентской медицинской академии – эпоха больших
свершений и открытий»**

Collection of materials of the scientific and practical conference with
international participation, dedicated to the 100th anniversary of the Tashkent
Medical Academy,

**"100 years of the Tashkent Medical Academy – the era of great
achievements and discoveries"**



их семей, нуждающихся в паллиативной помощи. Так, при числе 2391 смертей в год от ЗНО x 80% (коэффициент ВОЗ по потребности для данного нозологического заболевания) /100% = 1912 больных, нуждающихся в паллиативной помощи в год. Далее рассчитываем по формуле общее количество людей, нуждающихся в паллиативной помощи больных, нуждающихся в паллиативной помощи в год. Далее рассчитываем по формуле общее количество людей, нуждающихся в паллиативной помощи, с учётом членов семьи, ухаживающих за онкологическим больным. С расчётом того, что в среднем один или два члена семьи ухаживают за онкологическим больным, общее количество людей, нуждающихся в паллиативной помощи, составляет 3825 человек в Узбекистане.

Еще одной значимой проблемой при оказании паллиативной помощи является отсутствие специальных навыков ухода за инкурабельными больными. Для оказания соответствующего ухода необходимы не только медицинские знания, но и знания в смежных областях. Зачастую отсутствие необходимой подготовки становится значительной проблемой оказания помощи родственниками больного (на дому). Полученные в ходе исследования данные также свидетельствуют о том, что профессиональная паллиативная помощь является недоступной большинству нуждающихся в ней. Об этом заявили 89% респондентов. На вопрос «Достаточно ли внимания уделяется паллиативной помощи в практическом здравоохранении?» большинство (65 %) опрошенных ответило отрицательно.

Таким образом, очевидно, что на сегодняшний день доступность паллиативной помощи для большинства населения ограничена. Средний возраст опрошенных составляет 52 года. Нижняя граница возрастного распределения – 22 года, верхняя – 81 год. Большинство выборки составили женщины – 76% и только 24% респондентов – мужчины.

Таким образом, на основании анализа мнений различных групп респондентов можно сказать, что в современных условиях инкурабельные больные и члены их семей имеют ряд существенных проблем, значительно снижающих качество их жизни. Особенно остро стоят проблемы ограниченности специализированных учреждений паллиативной помощи и значительных финансовых затрат.

Выше указывалось на то, что немедицинские виды и методы помощи играют в паллиативной помощи не менее важную роль, чем собственно медицина. Необходимость комплексного подхода к реализации всех принципов паллиативной помощи, а не только обеспечения медицинской помощи, подтверждают и результаты проведенного нами социологического исследования. Так, в ходе опроса, проведенного в ноябре 2018 года (N=85 – респондентов) респондентам был задан вопрос: «Что, на Ваш взгляд, могло бы облегчить состояние безнадежно больного человека?».

EFFICACY OF ERADICATION THERAPY IN PATIENTS WITH HP-ASSOCIATED CHRONIC GASTRITIS.

Karimov M.M., Zufarov P.S., Sobirova G.N., Karimova D.K., Aripdzhanova Sh.S.

State Institution "Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Therapy and Medical Rehabilitation", Tashkent Medical Academy, Tashkent. Uzbekistan

The purpose of the study. To study the effectiveness of eradication therapy (ET) in patients with HP-associated chronic gastritis, depending on the morphological picture of the gastric mucosa.

Material and methods of research. The study was conducted in 50 patients (28 men and 22 women, average age - 53.4 ± 3.3 years) with HP-associated chronic gastritis. The diagnosis was verified according to esophagogastroduodenoscopy with targeted biopsy from 5 points of the stomach (2 from the body, 2 from the antrum and 1 from the small curvature of the stomach) and histological examination. The morphological picture was evaluated using the OLGA (Operational Link for Gastritis Assessment) system. The presence of HP was confirmed using a non-invasive respiratory C14 urease test (HUBT-20P Helicobacter pylori detector). Eradication therapy was

prescribed to all patients with chronic gastritis B. Patients took PPIs, amoxicillin, clarithromycin, bismuth tricalium decitrate for 10 days.

Research results: Conducting a four-component treatment regimen with the inclusion of the bismuth drug for 10 days showed the best results on both HP tests. Thus, according to the results of the respiratory test, eradication was achieved in 85% of patients. According to the results of the urease test, eradication was noted in 85% of patients. When summing up both research methods, complete eradication of HP infection was noted in 85% of patients, which can be assessed as a relatively satisfactory result. Analysis of unsuccessful responses to eradication therapy in 15% showed certain patterns. The results obtained show that in the absence of atrophy and in the presence of 0-1 to 3 stages and the degree of atrophy of the gastric mucosa according to the OLGA system, HP eradication was successful. However, if there is atrophy of 3-4 stages and degrees in the gastric mucosa, eradication could not be achieved.

Conclusions: The effectiveness of ET in patients with non-atrophic HP-associated chronic gastritis is significantly higher compared to patients with atrophic processes in the gastric mucosa.

ВЗАИМОСВЯЗЬ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ЖЕЛУДКА И ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭРАДИКАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ

Каримова Д.К., Каримов М.М., Собирова Г.Н., Нишанов Д.А.

ГУ «Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр терапии и медицинской реабилитации», г. Ташкент. Узбекистан

Цель исследования. Изучить влияние морфологических изменений в слизистой оболочке желудка на эффективность эрадикационной терапии.

Материал и методы исследования. Исследование проведено у 30 больных (18 мужчин и 12 женщин, средний возраст – $49,2 \pm 3,9$ год) с HP-ассоциированным хроническим гастритом (гастрит типа В). Верификацию диагноза проводили по данным эзофагогастродуоденоскопии с прицельной биопсией из 5 точек желудка (2 – из тела, 2 – из антрального отдела и 1 – из малой кривизны желудка) и гистологического исследования. Оценку морфологической картины проводили по системе OLGA (Operative Link for Gastritis Assessment). Наличие HP подтверждено с помощью неинвазивного дыхательного C14-уреазного теста (HUBT-20P Helicobacter pylori detector). Всем больным с хроническим гастритом В была назначена эрадикационная терапия. Пациенты принимали ИПП, амоксициллин, кларитромицин, висмут трикалия децитрат в течение 10 дней.

Результаты исследования: Проведение четырехкомпонентной схемы лечения с включением препарата висмута в течение 10 дней показало лучшие результаты по обоим тестам на HP. Так, по результатам дыхательного теста эрадикацию удалось достигнуть у 85% больных. По результатам уреазного теста эрадикация была отмечена у 85% больных. При суммировании обеих методов исследования, полная эрадикация HP-инфекции была отмечена у 85% больных, что можно оценивать как относительно удовлетворительный результат.

Анализ неудачных ответов эрадикационной терапии у 15% показал определенные закономерности. Полученные результаты показывают, что при отсутствии атрофии и при наличии 0-1 до 3 стадии и степени атрофии слизистой оболочки желудка по системе OLGA эрадикация HP была успешной. Однако, при наличии в слизистой оболочке желудка атрофии 3-4 стадии и степени, эрадикации добиться не удалось.

Выводы: Наличие выраженных атрофических процессов в слизистой оболочке желудка у больных ХГ являются неблагоприятными факторами при эрадикационной терапии.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СЕКЦИЯ	5
THE ROLE OF LIPID LOWERING THERAPY IN PATIENTS WITH CORONARY ARTERY DISEASE.....	5
Allaeva M.J., Irnazarov A.A., Boboyev B.M.....	5
RINOSEPTOPLASTIKADA STRESSGA QARSHI ANESTEZIYANI OPTIMALLASHTIRISH.....	5
Atashev A.R., Raximberganov S.M.....	5
ERKAKLAR VA AYOLLARDA DYUPYUITREN KONTRAKTURASI KLINIK BELGILARINI QIYOSIY TAQQOSLASH.....	6
Nazarova N.Z., Rashidov J.T.	6
VULVOVAGINAL INFEKSIYASI BO'LGAN HOMILADORLARDA ASORATLAR TAHLILI.....	7
Ochilova U.T.	7
BOSH MIYASI OG'IR JAROXATLANGAN BEMORLARDA KALLA ICHKI BOSIMINI KORREKSIYALASHDA OSMODIURETIKLARNI QIYOSIY BAHOLASH.....	8
Sabirov U.S.	8
COMPLICATED HEMANGIOMAS LASER AND MEDICAL TREATMENT OPTIONS.....	9
Sadykov R.R., Tursunova J.A.	9
MORBID SEMIZLIK BILAN OG'RIGAN BEMORLARNI BARIATRIK AMALIYOTDAN KEYINGI HAYOT SIFATINI BAXOLASH.....	9
Sobirov B.M., Teshayev O.R., Xolov X.A.	9
INNOVATIVE ORTHOPEDIC METHOD TREATMENT OF CLUBFOOT.....	10
Supiyev E.O. ^[1] , Nurimov G.K. ^[2]	10
SURUNKALI BAVOSILNI DAVOLASHNI ZAMONAVIY USULLARINING AFZALLIKLARI VA XUSUSIYATLARI.....	11
Xolov X.A., Sayidburxonov S.S.	11
ZAMONAVIY LIGASURE APPARATI YORDAMIDA GEMMOROIDEKTAMIYA JARROXLIK AMALIYOTINI KAM INVAZIV USULDA BAJARISH SAMARADORLIGINI BAXOLASH.....	12
Xolov X.A., Sayidburxonov S.S., Polvonniyozov X.G.....	12
АРТРОСКОПИЧЕСКИЙ ШОВ ПРИ ПОВРЕЖДЕНИЯХ МЕНИСКОВ КОЛЕННОГО СУСТАВА.....	13
Абдуразаков У. А., Абдуразаков А.У., Байзаков А.Р.....	13
РОЛЬ ТЕПЛОВИЗИОННОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ОДОНТОГЕННЫХ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ.....	14
Азимов А.М., Мизомов Л.С., Асомов А.	14
БИЛИОПАНКРЕАТОДУОДЕНАЛ СОҶА ЎСМАЛАРИ ОҚИБАТИДА КЕЛИБ ЧИҚҚАН МЕХАНИК САРИҚЛИКНИНГ ТУРЛИ ДАВРЛАРИДА САФРОДАГИ БИЛИРУБИН КОНЦЕНТРАЦИЯСИ ЎЗГАРИШИНИ ДИНАМИКАДА ЎРГАНИШ.....	15
Арипова Н.Ў. ^[1] , Матмуратов С.К. ^[2] , Бабаджанов Ж.К. ^[2]	15

COVID-19 O‘TKAZGAN BEMORLARDA GASTROENTEROLOGIK O‘ZGARISHLARNING ANIQLANISHI.....	140
Zargarova N.R.	140
JIGAR SIRROZIDA KLINIK- LABORATOR KO‘RSATKICHLAR VA HAYOT SIFATI..	140
Zaripov Z.O, Nazarova K.X.....	140
HOMILADORLIKDA TROMBOSITLAR PATOLOGIYASINING AHAMIYATI VA ULARNI ANIQLASHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI.....	141
Zaynutdinova D. L.....	141
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ У ДЕТЕЙ.....	142
Зокиров Б. К., Шамсиев Ф. М., Азизова Н. Д.	142
ИЗМЕНЕНИЕ БИОРЕГУЛЯТОРНОЙ СИСТЕМЫ ОКИСИ АЗОТА В СЛИЗИСТОЙ ЖЕЛУДКА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГАСТРОПАТИИ.....	143
Зуфаров П.С., Арипджанова Ш.С., Саидова Ш.А., Мусаева Л.Ж., Пулатова Д.Б.....	143
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У РАБОТНИКОВ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	144
Абдиева Ю.А., Агзамова Г.С.	144
ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У РАБОТНИКОВ ГОРНОРУДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ	145
Абдиева Ю.А., Агзамова Г.С.	145
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПО ОПРОСНИКУ SF-36 У БОЛЬНЫХ АНКИЛОЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ .	146
Абдурахманова Н.М., Ахмедов Х.С.....	146
КЎКРАК БЕЗИ САРАТОНИ РИВОЖЛАНИШИДА БИОКИМЁВИЙ ВА TP53 ГЕНИ RS1042522 ПОЛИМОРФИЗМИНИНГ БОҒЛИҚЛИГИ.....	146
Авезов Н.Ш. ^{1,4} , Қодирова Д.А. ² , Усманова Ш. Т. ⁴ , Шертаев М.М. ⁴ , Максудова А.Н. ⁵ , Бобоев К.Т. ³	146
КРИТЕРИИ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ СИЛИКОЗА.....	148
Агзамова Г.С., Ибрагимова Н.У., Алиева А.М.	148
НАРУШЕНИЕ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ У ЖЕНЩИН С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ НАДПОЧЕЧНИКОВОГО ГЕНЕЗА	148
Азизова Г.Д.....	148
ТАКТИКА ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ СО СТЕРОИДНЫМ ОСТЕОПОРОЗОМ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ	149
Арипджанова Ш.С., Зуфаров П.С., Акбарова Д.С., Абдусаматова Д.З., Сайфиева Н.Х. ...	149
ОЗОНОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ.....	150
Ш.М. Ахмедов ¹⁻² , Н.В.Гафнер ¹⁻² , Б.Ш. Келдиёров ¹ , Ш.Г. Матрзаева ¹	150
SARS-COV2 VIRUSI BILAN ASSOTSIYALANGAN PNEVMONIYADAN KEYIN BEMORLARNI KOMPLEKS REABILITATSIYA QILISHDA OZON TERAPIYASINING O‘RNI.....	151