



**MINISTRY OF HEALTH OF THE
REPUBLIC OF UZBEKISTAN**



**TASHKENT MEDICAL
ACADEMY**



ASSOCIATION OF DOCTORS OF UZBEKISTAN

**СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ МЕЖДУНАРОДНОЙ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
«СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»**

Toshkent - 2023

Зияева Ф.К., Джураева Э.Р., Ганиева Н.А., Исакова Э.И. / Атеросклеротические изменения сосудов при системной красной волчанке	43
Пулатова Ш.Б., Набиева Д.А., Мирзажоннова Г.С. / Взаимосвязь между поражением сердца и другими клиническими проявлениями анкилозирующего спондилита.....	44
Ширанова Ш.А., Набиева Д.А., Мухаммадиева С.М. / Особенности микробиоценоза кишечника у больных подагрой и влияние пребиотикотерапии на клиническое течение болезни.....	45
Джураева Э.Р., Зияева Ф.К., Бердиева Д.У., Махмудова М.С., Сирлибоев И.А. / Выявление факторов риска атеросклероза у больных ранним ревматоидным артритом	46
Тошназарова Н.Ш. / Эффективность комбинированного применения блокаторов рецепторов ангиотензина II и сердечных гликозидов при лечении рефрактерной сердечной недостаточности	47
Уракова З.У., Мухаммадиева С.М., Мирхамидов М.В. / Влияние уровня витамина D в сыворотке крови на течение заболевания у пациентов с ревматоидным артритом	48
Khakimov A.A., Muxamedov K.S., Ongarbayev D.O., Mamatov L.B. / Tuberculosis and rheumatoid arthritis: the links between the two diseases and how they affect each other	49
Ҷамраева Г.И., Хидоятова М.Р., Иноятова Ф.Х. / Ижтимоий изоляция шароитида касалликларни ривожланиши	50
Хидоятова М.Р., Исламова З.С., Халимбетов Г.С., Хамраева Г.И., Тангрибердиев К.Р. / Нарушения реполяризационных процессов в миокарде у больных COVID-19	51
Xidoyatova M.R., Nabiyeva D.A., Soliyev Z.S. / Takayasu kasalligida vazorenal gipertenziya.....	52
Хошимов Ў.Ў. / COVID-19 инфекцияси билан касалланган бош мия ўсмаси ташхиси билан даволанган беморларда инфузион-трансфузион терапиянинг гемодинамикага таъсири	53
Shonazarova N.X., Shodikulova G.Z. / Features of clinical course of rheumatoid arthritis in patients with thyroid pathology.....	54
Шукурова Ф.Н., Каримов М.Ш. / Распространенность HCV, HBV-инфекции и особенности поражения печени у больных ревматоидным артритом.....	55
Ergashev Sh.B., Nurmuxamedova N.S., Abduazizova N.X. / Osteoartritni erta tashxislashda ultratovush tekshiruvining o'rne.....	56
Эшмурзаева А.А., Сибиркина М.В., Гимадутдинова А.Р. / Роль анемического синдрома на состояние феррокинетики у больных ревматоидным артритом	57
Эшмурзаева А.А., Сибиркина М.В., Азимова М.М. / Влияние H. Pylori на состояние феррокинетики у больных ревматоидным артритом	58
Djurayeva E.R., Berdiyeva D.U., Yaqubova H.Z. / Yarali kolitli bemorlarda bo'g'im sindromining xususiyatlari	59

YARALI KOLITLI BEMORLARDA BO'G'IM SINDROMINING XUSUSIYATLARI

Djurayeva E.R., Berdiyeva D.U., Yaqubova H.Z.
Toshkent tibbiyot akademiyasi, Toshkent, O'zbekiston

Kirish: Ichakning yallig'lanish kasalliklarida bo'g'im sindromi keng doirada uchraydi, 40% gacha bemorlarda bo'g'im shikastlanishi turli xil variantlarda kechadi. Odatda ichakning yallig'lanish kasalliklarida seronegativ artralgiya yoki artritlar aniqlanadi, yarali kolit bilan kasallangan bemorlarning 5-10% ida, Kron kasalligi bilan og'rigan bemorlarning 10-20% ida rivojlanadi.

Maqsad: Yarali kolit bilan kasallangan bemorlarda bo'g'im sindromlarini erta aniqlash va oldini olish.

Material va metodlar: Toshkent tibbiyot akademiyasi ko'p tarmoqli klinikasi revmatologiya va gastroenterologiya bo'limida davolangan 70 nafar ichak yallig'lanish kasalliklari bo'g'im sindromi bilan statsionar tekshiruvda va davolanishda bo'lgan bemorlarning kasallik tarixini tahlil qilish.

Natijalar. Ichakning yallig'lanish kasalliklari bilan kasallangan va ichakdan tashqari sindromlardan bo'g'im zararlanishlari bo'lgan 70 nafar bemorning 36 tasi (51,43%) Kron kasalligi, 34 tasi (48,57%) yarali kolit tashxisiga ega edi. Kron kasalligida erkaklar- 58,33% (n=21), yarali kolitda ularning ulushi 47,02% (n=16) tashkil qiladi. Yarali kolit bilan kasallangan bemorlar orasida eng keng tarqalgani rentgen tekshiruvi manfiy bo'lgan periferik artralgiya edi. Radiologik diagnostika usullarida aniqlaganda bo'g'im zararlanishlari orasida sakroileit barcha bemorlarda bo'lgani kabi eng keng nozologik shakl edi (24,3%). Tarqalishi bo'yicha ankilozlovchi spondiloartrit yarali kolitda bo'g'im zararlanishlarining 2-turi hisoblanadi (8,8%).

Xulosa. Barcha bo'g'im zararlanishlari orasida bemorlarda periferik artropatiyalar ustunlik qildi. Ichakdan tashqari sindromlarning bo'lishi kasallikning yanada agressiv fenotipini va glyukokortikosteroidlarga yuqori ehtiyojni aks ettirdi. Anti- TNF-a dorilarini buyurish ichak yallig'lanish kasalliklarida ichak sindromlari va bo'g'im sindromini ham nazorat qilish imkonini beradi, ammo bu toifadagi dorilar bilan terapiya paytida preparat bilan bog'liq bo'lgan teri zararlanishlari rivojlanishi mumkin. Bunday holda biologik terapiyani boshqa toifadagi preparatga o'tkazishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: yarali kolit, Kron kasalligi, ichakdan tashqari sindromlar, bo'g'im sindromi, ankilozlovchi spondiloartrit, artralgiya, sakroileit, artropatiya.